


F. ix. c

18

48293/A

34197



EDSÉ YACÔES

1844

MOBILPHE J. 2701 P. 124



OBSERVAÇÕES

SOBRE A CURA

DA

GONORRHEA VIRULENTA.

7
OBSERVATIONS

ON THE

COMBINATION OF THE

34179

OBSERVAÇÕES

S O B R E A C U R A

D A

GONORRHEA VIRULENTA,

ESCRITAS EM INGLEZ

por

SAMUEL FOART SIMONS,

Doutor em Medicina, Membro do Collegio Real
dos Medicos, e da Sociedade Real de Londres,
Affociado estrangeiro da Sociedade Real de
Medicina de Paris , &c. &c. &c.

Nas quaes se estabelece a verdadeira natureza , e
e methodo curativo desta enfermidade , e se
destroem os erros vulgares , geral-
mente abraçados.

*Traduzidas , e accrescentadas com hum grande numero
de Notas , e addição de alguns Capitulos ,*

por

J O Z E B E N T O L O P E S ,

M E D I C O N O P O R T O .



P O R T O :

Na Offic. de Viuva Mallen , Filhos , e Compa-
nhia. Anno de 1794.

*Com Licença da Real Mesa da Commissão
Geral sobre o Exame , e Censura dos
Livros.*

*Aprovaõ este livro em Congregaçaõ de
Medicina de 31 de Maio de 1793.*

P. R.

Joaquim de Azevedo.



PREFACÃO DO TRADUCTOR.

O Motivo , porque o A. destas Observações se resolveo a publicallas no seu Original Inglez , he o mesmo , que me move a vertellas em o nosso idioma. Via elle os muitos , e funestos abusos , que reinavaõ entre os seus nacionaes ácerca da natureza , e curativo da gonorrhœa , e não podendo conter o seu zelo em favor da humanidade , intentou destruillos por meio da observação , unico caminho por onde deve adiantar-se a faudavel arte de curar. Vi eu tambem , que os Portuguezes se achavaõ nas mesmas , se não peiores circumstancias , quiz socorrellos , e logo me veio ao pensamento dar-lhes a ler no proprio idioma estas mesmas Observações , que há alguns annos me haviaõ vindo ás mãos.

Esta

Esta cruel enfermidade , tendo-se espalhado , e vulgarizado tanto entre nós , e sendo aliás mui difficil de curar pela variação que deve receber o seu tratamento em consequencia dos diversos temperamentos , e complicaçoens de symptomas , com que acommette ; todavia por hum muito inveterado , e fatal costume , he ella quasi sempre commettida aos Boticarios , Cirurgioens Vulgares , e até aos mais ignorantes curiosos , os quaes sem attenção ás circumstancias ponderadas , sem algum conhecimento da estrutura , e fysiologia das partes , que padecem , sem distincção de casos , e dos dous essenciaes periodos de inflammacão , e purulencia , que demandaõ hum tratamento inteiramente opposto , applicaõ sempre o mesmo methodo , e os mesmos remedios.

O que eu vejo praticar ordinariamente he o seguinte : Fazem beber ao doent-

doente por muito poucos dias algum cozimento mucilaginoso de malvas , althea , cevada , linhaça , &c: purgaõ logo depois o doente , tenha , ou naõ passado o periodo inflammatorio , e pela maior parte com purgantes drasticos: e feito isto, segue-se immediatamente a applicação de remedios balsamicos , especialmente do oleo de cupaiva , e dos seringatorios adstringentes , e irritantes , nos quaes remedios insistem pertinazmente até que ou o doente melhore, se o acaso assim o permite , ou desesperado deste Mesinheiro , vá buscar outro semelhante , o qual lhe repete de novo o methodo prescripto , e apenas varia segundo o seu modo a forma , ou numero de algumas drogas , que nada alteraõ a essencia da cura. Se a natureza he robusta , succede algumas vezes ceder a molestia no meio desta cega vereda , e ficar victorioso aquelle , entre cujas mãos a sorte collocara o paciente nesta occasião. Mui-

Muitos doentes porém fatigados de consultar diversos destes curadores, e da multidaõ de remedios, que por seu conselho foraõ obrigados a tomar, ou já porque a sua bolsa se acha esgotada, delesperaõ da sua melhora, desistem de todo o curativo, e regimen, e confiaõ inteiramente da providencia o seu restabelecimento

A natureza finalmente obra em alguns o que a arte depravada naõ pôde obter; mas naõ acontece isto á maior parte, os quaes ficaõ padecendo por muitos annos, ou toda a sua vida, rebeldes purgaçoens, apertos da urethra, retençoens de ourina, &c.

Naõ he de differente modo que eu vejo curar huma grande parte dos Medicos do nosso paiz, o que he bem facil de conjecturar, porque he certo, que aquelles sujeitos, que apontamos, he de algum destes que aprenderaõ o seu
per-

pernicioso methodo (a). Eu lamento a sorte dos meus compatriotas, não só a respeito desta, mas de muitas outras enfermidades, e desejo sinceramente melhoralla.

As Observações, que vou dar-lhes a ler do celebre Simons, sendo capazes de destruir os erros mais capitães do methodo proposto, ainda deixavaõ alguma cousa que desejar, por cuja razão fui obrigado a ajuntar-lhes hum grande numero de notas, as quaes são fundadas na doutrina dos melhores Práticos, que ultimamente escreveraõ desta materia, particularmente Schwe-

dia-

(a) Dos seus Compatriotas faz Stoll a mesma queixa „ Eu conheço muitos exemplos de gonorrhœas mal curadas (diz elle), e isto não só por Cirurgiões pouco experimentados, porém por muitos outros, e até por Medicos, que a sua luzida practica fazia mui recommendaveis. „ Rat. Med. Tom. 1. p. 171.

diaver, e Hunter, que na minha opinião excedêraõ a todos.

Os Cancros Venereos (cavallos), os buboens (mulas), estreitezas da urethra, hernias, &c, que muitas vezes acompanhaõ, e naõ poucas saõ consequencia da gonorrhœa, naõ escaparaõ á seria, e profunda investigação de Simons; por meio da qual combate, e refuta alguns erros, e abusos, que a este respeito vejo ainda dominar entre nós.

Eu suppri a summa concisaõ do A. com as notas que lhe accrescentei, tudo a fim de dar aos meus Leitores hum completo tratado sobre cada huma destas enfermidades. Nada finalmente poupei, de quanto podia concorrer para a perfeiçaõ da obra. Oxalá que este meu trabalho seja proveitoso, que eu naõ cessarei de applical-o em beneficio dos meus Concidadãos.

PREFACÃO DO AUCTOR.

O fferece esta Obra ao Publico algumas notas sobre huma enfermidade, que em diversos tempos merecera a attenção de Sydenhaõ, Boerhaave, Astruc, Vanfwieten, e outros muitos d'entre os mais famofos Escriptores de Medicina. E com effeito, laõ tantos os AA. que tem tratado este mefmo objecto, que talvez se julgue superfluo o que eu me proponho accrescentar ao que elles tem dito; mas he certo que a materia naõ está ainda esgotada; e naõ obftante grassar a Gonorrhea virulenta na Europa ha já para cima de duzentos annos (a), obferva-se com tudo,

(a) A opiniaõ commum sobre a primeira apparição da Gonorrhea Virulenta na Europa, a attribue ao anno de 1540. Porém Ale-

do , que os Medicos da primeira ordem tem variado de opiniaõ a respeito da sua natureza , e curativo. Espero que as minhas observaçoens augmentem o numero dos conhecimentos sobre esta materia , patenteando alguns erros , que até agora foraõ geralmente abraçados , e facilitando os meios de combater huma doença , as mais das vezes confiada a Charlataõs , ou aventureiros ignorantes , ao mesmo passo , que necessita de hum profundo conhecimento Anatomico , e Medico , para ser bem tratada. Aquelle Practico que naõ ajuntar ao conhecimento dos remedios , o da estrutura dos orgaõs , naõ se pode considerar em estado de proporcionar os ditos remedios á natureza dos doentes , e de variar o methodo ,
fe-

Alexandre Benedicto na sua Historia do Corpo humano , publicada em 1493 , nos assevera , que já no seu tempo a observara. Ved. Plenck. De Morb. Venereis. pag. 28.

segundo as differentes circumstancias , de maneira que venha a ser bem succedido no tratamento desta molestia (a). Mas por desgracia ha tanto desmazello neste particular , que estamos vendo todos os dias os Medicos , e Cirurgioens applicarem os mesmos remedios , sem distincção alguma , em todos os casos , e periodos da doença.

O uso das pilulas de Keyser nos dá hum exemplo bem palpavel desta disparatada pratica. He bem conhecida a grande efficacia deste remedio em certos casos ; porém em muitos outros he elle insufficiente , e não poucas vezes nocivo. Não obstante isto , quando foi introduzido nos Hospitaes Militares de França , houve huma ordem para não se applicar algum outro remedio

(a) Por esta razão VanSwieten , tendo de tratar da Gonorrhœa , faz primeiro huma completa descripção do membro viril. Ved. Comm. ao §. 1447. dos aforismos de Boerhaave.

dio nas molestias venereas. Este regulamento se conservou por muitos annos, até que os seus damnos foram tão manifestos, que se julgou indispensavel o dar aos Professores a liberdade de eleger os methodos, que julgassem mais proprios, e convenientes.

Eu tenho cuidadosamente evitado todo o raciocinio especulativo, limitando-me inteiramente aos factos de pratica, que recolhi das minhas observações, e experiência. Devo de mais advertir, que como me proponho tratar sómente da gonorrhœa virulenta, e das affecções locaes, que vem em consequencia della, apontarei com a possivel brevidade aquellas preparações mercuriaes, que parecem mais proprias para embaraçar os effeitos da absorvençia do virus, e evitar deste modo a infecção da massa dos humores. Se para o futuro tiver occasião, profundarei as propriedades de outras muitas composições

sições mercuriaes , e adiantarei consecutivamente as minhas indagações , relativas ao gallico confirmado , cujo methodo vulgar , por muitos motivos me parece ainda erroneo.

to the University, a significant number
of the students are interested in
the study of the history of the
country, and many of them are
interested in the study of the
history of the world.

The University of the South
is a large and beautiful campus
with many buildings and a large
library.

The University of the South
is a large and beautiful campus
with many buildings and a large
library.

The University of the South
is a large and beautiful campus
with many buildings and a large
library.

The University of the South
is a large and beautiful campus
with many buildings and a large
library.

The University of the South
is a large and beautiful campus
with many buildings and a large
library.

The University of the South
is a large and beautiful campus
with many buildings and a large
library.

The University of the South
is a large and beautiful campus
with many buildings and a large
library.



OBSERVAÇÕES

SOBRE O TRATAMENTO

DA

GONORRHEA VIRULENTA.

MUITOS, e mui engenhosos systemas se tem imaginado, para provar que a Gonorrhœa, e o mal venereo eraõ molestias differentes, que nasciaõ de duas distinctas especies de virus. Bom seria, que esta opiniaõ se estribasse em sólidos fundamentos, que a fizessem verdadeira; mas por desgraça, o que a pratica diaria tem mostrado, he a sua falsidade. Todos sabem, que a materia de hum can-

A.

cr

cro (a que o povo chama cavallo) cahindo dentro da urethra , gera huma Gonorrhea (a) , e *vice versa* a materia da Gonorrhea pôde produzir os ditos cancrios , os buboens , e o gallico (b).

Eu

(a) Qualquer materia acre , que caia , ou se introduza na urethra produz huma purgação bem semelhante á da Gonorrhea. Estas Gonorrheas não venereas tem sido observadas por Plenck , Alix , Whytt , Brendel , e outros muitos. Ved. Plenck De Morb. Ven. pag. 3. not.

Schwediaver celebre escritor Inglez , e cujas observaçoens sobre o gallico estão vertidas em Francez , debaixo do nome da Svediaur (na qual maneira o escreverei desde agora , visto servir-me da dita versão) fez destas Gonorrheas artificiaes , injectando dentro da urethra materias acres , e causticas ; e observou que ellas nada differiaão das venereas ; porém cedem mais facilmente ao uso dos adoçantes , e emollientes. Ved. a Traducção Franceza p. 50.

(b) O celebre Tode n'huma obra imprefsa em Copenhague no anno de 1777 , se esforça em provar , que o virus gonorrhoeico he di-

ver-

Eu tracto actualmente hum Official attacado de pustulas gallicas , dores nocturnas , e outros symptomas d'hum vicio venereo confirmado , cuja origem foi huma Gonorrhea supprimida por hum seringatorio adstringente. Começaraõ as pustulas a apparecer quasi seis semanas depois da supressaõ da purgaçaõ. O enfermo naõ teve cancos venereos , nem deu occasiaõ alguma a nova infecçaõ ; porém a sahida dolorosa da ourina no tempo da Gonorrhea , a intensidade da dor

A 2

em

verso do venereo ; mas a sua opiniaõ foi logo impugnada pelo grande Richter, Duncan, Plenck , e outros , os quaes dissolvendo os argumentos de Tode fizeraõ , com que a sua opiniaõ fosse seguida de mui poucos. Naõ obstante isso, e o ser ella ultimamente refutada por Svediaur, Hunter, Stoll , Nisbet , e os AA. mais acreditados, e celebres, com tudo ainda esta opiniaõ passa por controversa ; e alguns dos fundamentos , em que Tode se estriba, naõ tem sido desfeitos com toda aquella satisfacaõ , que desejão os verdadeiros amantes da verdade.

em hum mesmo ponto , meia pollegada pouco mais ou menos acima do orificio da urethra e hum leve aperto , que lhe ficou depois neste canal , nos convencem, de que hum pequena ulcera existira naquelle lugar , e tinha dado occasião á absorvencia do virus.

Há bem pouco tempo , que fui consultado por hum cavalheiro de Staffordshire, o qual, dous mezes antes tinha contrahido hum Gonorrhœa virulenta ; e cuja purgação era amarellada , abundante , e acompanhada d'huma grande dor , e inflammacão. O primeiro Pratico , que consultou , prescreveo-lhe a sangria , repetidas doses de maná , e alguns faes , com hum dieta fresca. No fim de dez , ou doze dias , quando os symptomas inflammatorios começaraõ a diminuir , tomou o doente grandes doses de oleo de cupaiva , e usou d'hum seringatorio , que lhe causava grande ardor (cuisson) na urethra. Cessou em oito dias a purgação, e

e julgando-se o doente curado , voltou a sua casa : mas pouco tempo depois me effrevo , que lhe sobreviera hum bubão á virilha direita , e algumas ulceras ás fauces. Bem poderia eu referir ainda outros casos semelhantes , que tenho observado, porém bastarão, estes dous para provar , que a materia d'huma Gonorrhea transportada para a massa geral dos humores póde produzir todos os symptomas de gallico confirmado. Com tudo , para que isto aconteça , talvez seja necessario , (bem que disso não tenhamos huma prova evidente) que aquella materia provenha sempre d'algun ponto de ulceração (a).

Mui-

(a) A opiniaõ geral actualmente recebida he , que a Gonorrhea não communica o virus venereo ao todo , senão porque ou durou muito tempo , ou foi mal tratada, ou se formou alguma chaginha no interior da urethra. Logo he sempre necessario em semelhantes casos lançar mão do mercurio , que aliás seria desnecessario , como adiante veremos.

Muitos, e mui respeitaveis Praticos negaõ, que a Gonorrhœa possa produzir no interior da urethra huma tal ulceraçãõ: a secreçãõ do muco augmentada lhes parece em tudo semelhante; ao que acontece n'hum verdadeiro catarro; porém esta comparaçãõ he defeituosa. O catarro attaca, e irrita igualmente toda a membrana, pituitaria, quando na Gonorrhœa sãõ só certos pontos da urethra, os que parecem estar offendidos. O mal não passa de ordinario acima de pollegada, e meia da extensãõ deste canal; e muitas vezes, principalmente no principio, se limita a hum só ponto collocado huma pollegada acima da extremidade da Glande. A purgaçãõ vem daquelle parte, onde a dor se faz sentir, e quando o enfermo ourina, não sente algum ardor, em quanto a ourina não tocá este ponto inflammado. Ao passo que o mal se augmenta, occupa a inflamaçãõ maior numero de pontos, propagando-se, do

mes-

mesmo modo que os cancrios venereos se dilatao na superficie da Glande.

Podia-se esperar, que a disseccao anatomica tivesse ja illuminado esta materia, e terminado a questao ; mas nao he assim. Eu examinei a urethra de muitas pessoas, que padeciaõ a Gonorrhoea ao momento da sua morte ; e tres vezes tenho notado no interior deste canal aquillo mesmo , que Morgagni refere ter encontrado nos casos , que publicou no seu livro de *Sedibus , & causis morborum* * ; isto he alguns signaes , ou vestigios profundos de cor avermelhada , e cubertos de muco sem alguma apparencia de ulceracao (a).

Quando me achei em Pariz , assisti a outras duas disseccoens , em que os circunstantes se persuadiraõ ter distinguido
com

(*) Ved. Epist. 44. n. 1. 8.

(a) Tem sido isto mesmo confirmado pelas disseccoens de Plenck, Stoll , Svediaur , Hunter , e d'outros Praticos modernos.

com evidencia alguns vestígios de ulceração : passamos a examinar a cousa mais attentamente , por meio d'humã lente , e quanto a mim confesso nada ter descoberto , que me fizesse decidir com toda a certeza.

Por outra parte tenho verificado em muitos sujeitos o mesmo , que tem alleverado varios Anatomicos á cerca das manifestas cicatrizes de antigas ulceras do canal da urethra : e com effeito , se nos lembrarmos daquella côr sanguinolenta , que se mistura muitas vezes com a materia da Gonorrhœa , não podemos duvidar da rotura d'alguns pequenos vasos sanguineos , e da possibilidade d'humã ulceração , a qual realmente se offerece frequentes vezes á nossa vista junto do orificio deste canal. Ninguem duvida , de que crescendo a inflammação em demasia, se deva temer a ulcera. Além do que , vemos em consequencia d'humã Gonorrhœa desprezada , ou tratada mal

mal , succederem as fistulas do perineo , e outtas chagas penetrantes da urethra , pelas quaes se extravasa a ourina. E quem duvida , de que as ligeiras escoriaçoens deste canal possaõ ter lugar repetidas vezes , e desvanecerem-se depois (da morte) , assim como succede nas amygdalas , papillas da lingua , margens das palpebras , &c? Huma semelhante oblitteraçã se executará mui facilmente em huma parte tal , como a urethra , que está coberta de mucos , e por este modo defendida do toque do ar , cujo effeito he de endurecer as cicatrizes (a).

Fei

(*) A pèzar de todas estas reflexoens devemos persistir na universal opiniaõ, de que a ulcera não he da essencia da Gonorrhœa , e se ella alguma vez acontece he mais depressa hum effeito desta molestia , como nos adverte Stoll. As mais das vezes, por não dizer quasi sempre, existe a Gonorrhœa sem aquelle symptoma. Swediaur affirma , que de cem talvez não appareça huma , em que se verifique huma verdadeira ulceraçã.

Feitos estes reparos , a idéa mais adequada , que se póde formar das causas , e symptomas desta enfermidade he , que as particulas do virus venereo , sendo misturadas na occasião do cóito com o esperma , e mucos , he attrahido ao interior da urethra , até hum certa altura , e alli produz hum irritação , proporcionada á sua acrimonia , e á irritabilidade , e outras disposições do doente. As consequencias desta irritação devem ser a inflammação , e hum maior secreção de mucos (a); e até aqui não temos mais , que hum vicio local.

Porém ha de acontecer de tempos em tempos , que esta inflammação , assim como succede em todas as outras , venha a produzir hum ulceração ; e neste caso corre o enfermo grande risco de adquirir hum infecção constitucional ; o que tambem póde succeder sem a dita ulceração.

(a) Eis-aqui o que deve constituir a verdadeira effencia da Gonorrhœa virulenta.

ração , posto que a prova disto , como eu já adverti , não seja da primeira evidencia.

Sabe-se que os remedios drafticos concorrem muito para a absorvencia do virus : eu mesmo tenho visto alguns exemplos de gallico , o qual me pareceo devido ao uso imprudente destes purgantes, dados em huma Gonorrhœa antecedente (a).

O

(a) Tudo aquillo , que desicca os nossos humores , e os priva da sua parte serosa , e mais tenue , augmenta a absorvencia geral daquelles liquidos , que se achão derramados nas diversas cavidades , e reservatorios do nosso corpo: o que a natureza faz, para haver de supprir aquella perda , que por outro lado lhe fazem soffrer.

Por esta razão he, que os purgantes fortes, despojando os humores d'huma grande copia de sero , concorrem para que o virus depositado no muco , e mais succos , que lubricaõ a urethra , seja promptamente absorvido com os ditos succos para a massa geral dos humores.

O tempo em que esta molestia costuma apparecer depois da infecção, he muito variavel. Dever-se-há talvez collocar o termo medio entre o 4.^o, e o 14.^o dia (a). Algumas vezes se manifesta os symptomas em 24 horas; e outras só no fim de 5 ou 6 semanas: porém estes dous extremos são pouco communs.

Nos homens consistem ordinariamente os primeiros symptomas, n'hum desagradavel sensação, bem semelhante á mordedura de pulga, na extremidade do membro, alguma tensão do mesmo, certa intumescencia das bordas do orificio da urethra, e hum aperto deste canal. A ourina sahe em fio delgado, e com desigualdade: algum muco esbranquecido escorre de dentro da urethra, principalmente, quando se comprime de cima para

(a) Tem mostrado a experiencia, que quanto mais tarde apparece a Gonorrhœa depois do acto da infecção, maior rebeldia tem em se curar.

ra baixo, e sobre o ponto doloroso. Augmenta-se brevemente a purgação, variando a sua cor, segundo o gráo da inflamação; sente-se certo calor, e dor quando se ourena, especialmente em alguns pontos da urethra, e junto do seu orificio; e as erecções involuntarias, que por causa do estímulo, são mui frequentes, sobre tudo de noite no calor da cama, occasionão huma tortura, ou curvatura do membro, mui dolorosa, e sensível ao paciente.

Se a inflamação he violenta, a glándula se intumece, e põe luzidia; e a tenção cresce, e se estende a todo o membro; o perineo incha, e se faz vermelho; os mesmos rins, as nadegas, e o ano, por causa da sympathya dos nervos, experimentão huma importuna, e desagradavel sensação. Algumas vezes se inflamma a extremidade do prepucio, e não póde recuar a traz, o que constitue huma perfeita *fimose*; outras fica elle entalado a traz da

da glande , de fórte que não póde puxar-se adiante, e neste caso temos a *parafimose*. Se o aperto , e inflammação são mui consideraveis , deve-se temer a gangrena. Nota-se tambem algumas vezes, principalmente quando existe a *fimose* , humma especie de corda dura , que continúa ao correr do dorso do membro , a qual vem a ser hum intumescimento lynfatico , que se estende até o bubaõ.

Nos casos benignos he o assento do mal junto do orificio da urethra (*a*) , como já advertimos ; porém , não poucas vezes lóbe o virus , e se insinúa tanto acima , q̃ vai attacar as glandulas do Cowper, a prostata, e as partes visinhas do callo da bexiga (*b*). Geralmente fallando cresce a inflam-

(*a*) Vem a ser na fossa navicular , que corresponde ao sitio da glande , e se alcança com a propria vista , logo depois da entrada da urethra.

(*b*) Estes casos são muito mais rebeldes na sua cura.

flammação em muitos dias : a duração ordinaria deste augmento he de huma até duas semanas. Depois disto principiaõ os symptomas a diminuir , e abandonada a purgação a si mesma , tambem diminúe pouco a pouco , e se faz mais branca , e espessa , até que ultimamente se suspende de todo. Eu não digo , que a côr do muco seja huma guia segura ; pois que este póde conservar até o fim huma côr amarellada , ou verdoenga ; porém de ordinario faz-se elle mais espesso para a declinação da enfermidade.

Como nas mulheres são menos complicadas as partes da geração , igualmente a Gonorrhœa o he mais do que nos homens. Se a vagina só he atacada , valem mais pouco os symptomas. Commummente principia o mal por hum sentimento de calor , e pruído , assim como acontece no outro sexo : estende-se a inflammação , e passa a comprehender as nymfas , o interior dos labios , o clitoris ,

ca-

carunculas myrtiformes , e algumas vezes todo o canal da ourina. Frequentes vezes são atacadas as glandulas profundas da vagina , e he mui difficultoso o distinguir a purgação d'hum fluxo branco da de huma Gonorrhea (a).

el-

(a) Eis-aqui os finaes mais ordinarios, por onde podemos distinguir estas duas enfermidades. O fluxo branco começa quasi insensivelmente sem ardor , calor , ou outro semelhante incommodo do paciente. Cresce com tanta lentidão , que o seu augmento se estende a mezes, ou annos. Só depois de hum dilatado curso, he que se faz acre , e toma a côr amarellada , ou verdoenga ; e he então que apparecem as escoriações , ardores , &c. Pelo contrario a Gonorrhea attaca repentinamente , augmenta-se com muita brevidade , e he logo acompanhada de ardor , e calor : a côr da purgação , que no seu primeiro principio foi branca , muda logo para amarella , ou verde : algumas vezes he tambem sanguinolenta por causa da corrosão de alguns vasos. A copia do fluxo branco , quando este he antigo , tambem costuma exceder

A' vista da exposição , que havemos feito do progresso desta doença , facilmente se póde colligir, que as principaes indicaçoens curativas vem a ser, de diminuir a inflammação , e de destruir o virus , que he a sua causa. Alguns Praticos

B

sup-

muito á da Gonorrhœa. As causas antecedentes podem ainda dar alguma luz nesta materia : v. gr. se a doente teve algum ajuntamento suspeito &c ; bem que esta circumstancia nos he negada as mais das vezes. Finalmente quando houvermos de distinguir hum fluxo branco , da Gonorrhœa ; não nos esqueceremos daquelle signal , que Baglivio chama infallivel ; e vem a ser , que a purgação da Gonorrhœa he continua , e jamais se interrompe no tempo da menstruação , o que não acontece ao fluxo branco , o qual nesta occasião cessa totalmente de correr. V. Prax. Med. lib. 2. cap. 8. §. 3. Resta-nos advertir , que sendo em as mulheres o assento da Gonorrhœa na vagina , a dor , o ardor , e mais incommodos , que os homens soffrem , quando ourinaão , vem a ser nellas muito mais toleraveis.

suppoem , que o corpo goza a faculdade de expulsar o vírus , e que a molestia deve correr hum certo periodo, visto que ella apresenta hum augmento , hum estado , e huma declinação. Por este motivo entregaõ a cura toda á propria natureza , ou quando muito se contentaõ com a ajudar , por meio d'hum regimen antiflogistico , algumas leves evacuaçoens , &c. Não há duvida , que esta cura natural tem lugar em muitas circumstancias, quando augmentada a secreção do muco traz fóra comsigo a materia virulenta , antes que esta tenha tempo de inficionar os humores (a) ; porém jamais deixará de ser util o uso dos remedios convenientes na parte inflammada , para rebater a duração , e intensidade dos symptomas, o que podemos fazer com aquella mesma segurança , com que applicamos os topicos
ap-

(a) Hunter vio muitas curas destas , terminadas inteiramente pela natureza. V.A Treatis. on the vener. Disceas. Lond. 1766. p.96. 70.

appropriados para vencer os effeitos de huma ophtalmia , ou outra inflammacão local.

Os remedios geraes , assim como huma sangria feita a proposito , a dieta refrigerante , o grande uso de bebidas diluentes , e os purgantes brandos (a) são

B 2 de

(a) Por mais brandos que os purgantes sejam , não convem no periodo da inflammacão. Todos os purgantes irritaõ , e Stoll diz expressamente , que não conhece purgante algum antiflogistico ; porque todos augmentaõ mais ou menos o movimento dos humores, e a inflammacão. V. Rat. Med. T.1.p.175. e Prælect. in Divers. Morb. Chron. Vindobon. 1788. pag. 108. Eis-aqui como Hunter se exprime a este respeito. „ Como podemos nós pensar , que huma ir-
 „ ritacão feita no decurso do canal intestinal ,
 „ haja de curar a inflammacão particular da u-
 „ rethra ? Ha todayia alguns casos , em que
 „ hum purgante activo tem sido proveitoso , e
 „ até tem completado a cura : mas eu suspeito,
 „ que nestes casos tinha a molestia continuado
 „ por hum puro habito, e que este methodo ap-
 „ pli-

de huma utilidade , ou dizendo melhor ,
de huma necessidade universalmente re-
CO-

„ plicado no principio , não haveria tido o mes-
„ mo successo „ = ibid. pag. 72. Vejamos ain-
da o que nos diz Clare sobre esta mesma ma-
teria. „ O Doutor Cullen diz (he Clare o que
„ falla ,) que os purgantes não só inflammaõ o
„ recto (intestino ,) mas que levaõ a sua ir-
„ rita ção ao mesmo canal da urethra. Por ven-
„ tura a Gonorrhœa encabrestada , e o priapif-
„ mo , (erecção involuntaria , e molesta , mui
„ continuada) não devem attribuir-se muitas
„ vezes a esta causa ? O Doutor Fordyce re-
„ commenda , que se sollicitem brandamente
„ as evacuaçoens por meio de purgantes sua-
„ ves , e que não movaõ o ventre , se não
„ duas , ou tres vezes por dia ; mas quem nos
„ póde segurar, de que o doente não ha de
„ obrar, se não duas ou tres vezes no dia ? De-
„ pois que os intestinos forem postos em ac-
„ ção , limitar-se-haõ acaso a produzir sómen-
„ te aquelle numero de evacuaçoens , que jul-
„ gamos necessario ? Mas por felicidade pare-
„ ce , que nestas occasioens se podem dis-
pen-

conhecida. Julgava Astruc , que a sangria devia repetir-se 5 ou 6 vezes: outros muitos

„ pensar os doentes do uso dos purgantes ,
„ ainda mesmo dos mais brandos.

„ Acrescenta este Medico , que os purgan-
„ tes fortes augmentão muitas vezes os sym-
„ ptomas inflammatorios da Gonorrhœa , ex-
„ citaõ a estranguria , e ulceração das partes ;
„ occasionaõ a inflammação dos testiculos , e
„ partes vizinhas , ou suspendem a purgação ,
„ antes que o virus seja destruido ; e que en-
„ tão ou a Gonorrhœa volta dentro de pou-
„ cos dias , ou produz ulceras nos lugares ,
„ que occupava. Diz elle mais , que o dilatado
„ uso de purgantes póde enfraquecer o estoma-
„ go , e intestinos , perturbar as digestões ,
„ occasionar purgaçoens rebeldes , e produzir
„ nos enfermos huma affecção hypocondria-
„ ca , principalmente nos que são de complei-
„ ção irritavel , e de temperamento melanco-
„ lico.

„ Bem podia eu (conclue Clare) referir
„ aqui huma multidaõ de auctoridades , para
„ provar os máos effeitos dos purgantes ne-
„ sta

tos Medicos tem a mesma confiança na repetição desta evacuação: porém apenas

„ esta doença, a qual em geral he de longa
„ duração, quando se trata deste modo „ .
V. Method. Nouvell. de Guerir la Mal. Vener. p. Mr. Clare, Traduzid. do Ingl. Londr. 1785. pag. 107. — 108. Apontarei ainda a opinião de Svediaur, que he de grande peso nesta materia. „ Tem-se conservado por
„ muito tempo (diz este celebre Escriptor)
„ outra preocupação, a qual vem a ser em
„ favor dos purgantes na Gonorrhœa. Tem
„ alguns usado dos minorativos; outros dos
„ purgantes mais drásticos, mas sobre tudo
„ se tem recommendado os calomolanos de
„ dous em dous, ou de trez em tres dias.
„ De nenhuns destes remedios tenho visto o
„ menor beneficio, ao mesmo passo que muitas vezes são prejudiciaes, e fazem muito
„ mal, alem de concorrerem para a absorven-
„ cia do virus para a massa geral dos humores, da mesma forte que os seringatorios applicados intempestivamente. Elles occasionaõ muitas vezes a inchação dos testi-
„ cu-

nas se encontra hum enfermo entre dez ,
a quem ella convenha ; e só deve ter lugar

„ cujos , as molestias da glandula prostatica ,
„ a supressão da urina , as ulceras da ure-
„ thra , e bexiga , &c. Bem que não seja ne-
„ cessario usar de purgantes , he todavia con-
„ veniente conservar sempre o ventre lubri-
„ co , de maneira que o doente obre todos os
„ dias. A estas proveitosas mudanças , que se
„ tem feito na pratica , he que se deve , se-
„ gundo eu creio , a vantagem que hoje se
„ observa , de que mui ra raras vezes são
„ as Gonorrhœas seguidas dos symptomas do
„ Gallico , ou chagas da bexiga. „ Ved. Ob-
serv. Pratic. sur les Malad. Vener. Trad. de
l' Angl. A Paris 1785 pag. 63. seg.

Concluirei finalmente com a sentença do
nosso Portugez Madeira , cujo methodo he
muito conforme ao destes grandes homens
modernos. „ A materia da purga , diz elle ,
„ disputaremos na segunda parte desta Obra
„ em que mostraremos ao claro não convir
„ nestes principios , porque accrescenta as in-
„ flammações baixas , move a urina , aquen-

„ ta

gar nos sujeitos robustos , e plethoricos ,
por exemplo , naquelles que tiverem hu-
ma

„ ta mais as partes , e move maior fluxão ,
„ ou a incrua , e faz outros damnos , por cu-
„ jo respeito a reprova Galeno em semelhan-
„ tes casos. E assim , nem ainda os lenitivos
„ brandos neste caso são seguros , e por tan-
„ to nem estes se devem dar , posto que
„ alguns AA. o aconselhaõ. Mas com o bom
„ regimento , que logo diremos , e applica-
„ ção dos medicamentos attemperantes assim
„ externos , como internos , se acodirá aos
„ symptomas do principio até que se miti-
„ guem , e depois se fará a cura radical , sen-
„ do necessario (como abaixo diremos) ,
„ porque muitas vezes basta fazer o que te-
„ mos dito , para que perfeitamente farem. „
O que elle deixa dito são os adoçantes , de-
mulcentes , refrigerantes , e alguns antispas-
modicos. Ved. Madeira Illustrad. Method. de
conhecer, e cur. o Morb. Gall. pag. 69.

Estendi-me em refutar o uso dos pur-
gantes no primeiro periodo da Gonorrhœa ,
por

ma erecção frequente , e dolorosa , e o pulso duro , e cheio (a). Neste caso humana

por ser este o methodo ordinario , e vulgarissimo , com que esta molestia he tratada entre nós, não só pelos Charlataens , e Mezinheiros , mas tambem pelos Professores pouco sabios , e cuidadosos em ler os grandes Praticos , e observar attentamente os bons , e maos successos dos seus Methodos. Os cristeis emollientes , e laxantes devem fazer as vezes dos purgantes no mencionado periodo ; e sô quando estes não bastem para vencer a rebeldia , e pertinaz constricção do ventre , he que será licito , conforme a opiniaão de Cullen (Elem. de Medicin. Practic. §. 1772) lançar mão d'algum brandissimo purgante ; ainda que neste mesmo caso será mais seguro ajuntallos antes aos cristeis , do que tomallos pela bôca , pela razão de que não passando o seu effeito alem dos intestinos grossos , commovem muito menos a circulaçaão do sangue , e o systema geral recebe pouco , ou nenhum abalo.

(a) Mostraão estes signaes , que o systema

ma sangria de 8, até 12 onças de sangue será muito efficaç, e raras vezes será preciso repetilla. O que alimenta a inflammação he o estímulo local do virus, e da ourina: por tanto nada se póde esperar da sangria, senão o moderar a dor, e frequencia da erecção; nem póde ser de beneficio ás pessoas de compleição delicada, ou que tem a fibra

stema geral padece, e se comprehende no estado flogístico da molestia, em cujas circumstancias se não pode dispensar a sangria. D'outra sorte nunca ella vem a ser necessaria, visto que contribue mui pouco para a cura da particular inflammação da urethra. E quando nesta pareça necessaria, ou util alguma evacuação de sangue, será mais proveitoso fazella por meio de sanguifugas, lançadas sobre a mesma urethra. Svediaur antepoem esta evacuação local á sangria, recommendando juntamente o uso das fomentações, e cataplasmas emollientes. L. C. p. 61.

(a) As

bra mui irritavel ; e quando se repita , póde chegar a ser damnosa , augmentando a irritabilidade , e fazendo assim o doente mais susceptivel do estimulo (a).

He manifesta a utilidade , e necessidade de hum regimen refrigerante. O vinho , e licores espirituosos , a carne dos animaes , o mesmo peixe , e todo o alimento salgado, e de especiarias , augmentaráõ constantemente os symptomas. Basta huma comida no dia , e esta leve (b) : o doente deve fugir de mantiti-

(a) As evacuaçoens , sejaõ de sangue , ou de purgantes , não podem ser uteis ás pessoas desta natureza ; e antes em seu lugar se deve fazer uso de corroborantes , assim como da quina , &c. V. Hunter L. C. p. 84 ; e Svediaur p. 61.

(b) Este preceito deve ser observado á risca pelos sujeitos d'hum temperamento forte , e flogistico ; porém aos de temperamento mais debil , e delicado deve-se conceder na dieta alguma largueza mais.

timentos calidos. O leite, os vegetaes doces, e os frutos devem constituir a parte principal da sua dieta, em quanto durar a flogose, ou inflammação. Deve evitar com o maior desvelo, tudo o que póde conduzir a imaginação aos prazeres de Venus, pelo temor de excitar as erecções, e augmentar a inflammação. Por este motivo devem ser nocivos os passeios, ou jornadas, sejaõ de pé, ou de cavallo, por causa da irritação, que produzem no perineo. Deve-se finalmente acautelar tudo, o que he capaz de excitar, e augmentar o calor, e movimento do sangue.

Os liquidos doces, refrigerantes, e mucilaginosos, bebidos em abundancia, a infusão da linhaça (a), o leite, o foro de leite, a agoa, a orchata, as emulsões, ou amendoadas, &c. diluirão

(a) O Doutor Fordyce aconselha a infusão de linhaça, feita pelo modo seguinte.

R.e

rão consideravelmente a ourina, e farão com que os seus faes não estimulem a urethra (a). Quando o ardor da

R.^e De linhaça huma onça e meia.

De semente de falsa oitava e meia.

Agua da fonte huma libra.

Infunda por espaço de meia hora; coe e ajunte de summo de limaõ, e assucar q. b. para gosto. *Prec. sur les Malad. Ven. p. 22.*

(a) Para evitar a longa demora da ourina na bexiga em o tempo do sono, e acautelar a maior acrimonia, que ella deve adquirir por esta demora, recommenda Vanfwieten, que o doente antes de se deitar beba duas libras de algum liquido apropriado. Passadas 3, ou 4 horas, diz elle, acordará o doente espontaneamente, para haver de urinar: urine pois; beba outra larga porção d'hum semelhante liquido, e continue a dormir. Deste modo não só evitará a maior acrimonia da ourina, mas tambem a accumulacão da materia puriforme dentro da urethra, a qual se lava, e purifica com a passagem da ourina.

da urina for mui forte na occasião de urinar, devemos servir-nos das substancias mucilaginosas, e sobretudo da goma de alcatira. A pratica geral he o prescrever esta goma, ou a arabia misturada com nitro, e dissolvida na bebida, que se toma, a fim de moderar a inflammação; porém o nitro he sempre contraindicado, como diuretico; porque a sua principal acção he sobre as vias da urina, e o estimulo que nelas excita póde augmentar o mal, que intentamos diminuir (*a*). O cremor de tarta-

V. Vanswieten Comm. in Aphor. Boerhaav. §. 1458. pag. mih. 478. (A minha edição he a original de Leiden).

(*a*) Esta advertencia he muito interessante. Eu tenho observado algumas vezes, que a applicação do nitro, ainda que unido com a gomarabia, e outros mucilaginosos, augmentava o ardor e calor da urina, os quaes se moderáraõ, logo que o tirei, e fiz continuar as outras bebidas. Referi-

tartaro será igualmente nocivo , por causa da qualidade diuretica , que também possui. O nosso fim não he o de promover hum fluxo extraordinario de ourina ; porque sendo o virus indissol-

lu-

ferirei aqui as palavras do Doutor Hope , para melhor convencer os meus Leitores.

„ Comrudo , (diz elle nas suas liçoens de
„ Materia Medica , fallando do uso do nitro
„ em o nosso caso) eu creio , que esta pra-
„ tica he fundada na palavra *ardor* , de que
„ constantemente se faz uso para caracterizar
„ a dor , que se experimenta em urinando ,
„ durante a inflammação venerea da urethra ;
„ e em o nome , e virtudes refrigerantes , que
„ sempre se attribuirão ao sal do nitro. Mas
„ he certo , que a ourina , que se lança no
„ tempo da inflammação venerea, não he mais
„ quente , do que em outro qualquer tempo :
„ logo o applicar hum refrigerante para extin-
„ guir este calor , he hum absurdo. Até me
„ persuado , de que aquelles que a este respei-
„ to fizerem hum exame imparcial , e sincero ,
„ não de ficar convencidos , de que o ni-

„ ni-

luvel na agoa , não póde ser expulso por este caminho. O unico fim , que nos devemos propor , he o fazer a possível diligencia , para que a secreção da ourina seja doce , e pouco estimulante.

As

„ tro não tem a virtude de diminuir a dor, que
 „ se sente no caso presente ; porque eu o te-
 „ nho applicado em todos os estados desta mo-
 „ lestia , em grandes , e em pequenas doses, e
 „ depois de grande numero de experimentos
 „ sobre o uso deste remedio , não sendo elle
 „ misturado com algum outro , jámais pude
 „ alcançar , que elle produzisse o mais peque-
 „ no allivio. Nenhum sedeve com effeito espe-
 „ rar , se attendermos á causa desta dor , e
 „ aos effeitos, que o nitro deve produzir. Não
 „ podemos negar , que neste caso , he a dor
 „ occasionada pelos faes acres da ourina , que
 „ irritaõ a urethra inflammada , e escoriada.
 „ Porem a dissolução do nitro applicada so-
 „ bre huma parte escoriada , nunca deixou de
 „ produzir huma consideravel dor. A experien-
 „ cia nos mostra , que a ourina se carrega das
 „ par-

As purgas brandas, que constituem outra parte dos remedios geraes, são sem dúvida mui uteis, quando se administraõ com prudencia; mas tem mostrado a experiencia, que o abuso dellas, tem produzido na Gonorrhœa accidentes numerosos. A pratica geral d'algun dia consistia em dar 3, ou 4

Cevyve A. 7010 ve-

„ partes do nitro, que passou pelo estomago.
„ Donde se collige, que quanto maiores forem as doses deste sal, tanto mais se carregará a ourina das suas particulas, e por conseguinte, conservará em maior auge aquelle estimulo, que irrita os solidos. Concluamos pois, que este sal tão longe está d'ediminuir a dor, que o enfermo experimenta, que pelo contrario deve contribuir ao seu augmento. „

„ Ha muitos estomagos tão fracos, e tão delicados, (continua este Medico), q̃ não podem soffrer o frio, que o nitro excita; e outros ha, a que elle causa sempre nauseas, e agonias. „ Esta passagem pode-se tambem ler na obra citada de Clare. pag. 109. seg.

vezes na semana grandes doses de calomelanos ao deitar da cama, e no dia seguinte pela manhã fazer tomar ao doente huma boa dose de pirolas cocheas, ou outro purgante drastico (a). Este methodo era continuado por muitas semanas: e como o effeito constante de hum violento purgante he de augmentar a absorvencia dos vasos, era o virus as mais das vezes introduzido na massa do sangue, e produzia o gallico confirmado. O menos que acontecia, ainda no caso de escapar o doente

¹ (a) Não he muito, que o uso dos purgantes drásticos fosse geralmente admittido, depois de o aconselhar Sydenhaõ, Boerhaave, e outros Praticos da primeira ordem. V. Sydenhaõ Epist. respoñt. a Henriq. Paman. de Luis Vener. histor. & curat. Boerhaav. De lue aphrodisiac, &c. Todos os Medicos foraõ apõz estes grandes homens, e assim se radicou huma pratica pernicioza, que tanto tem custado a extirpar, e que por desgraça ainda hoje reina no commum dos Professores, e Mezinheiros.

te deste mal terrivel , era o ficar-lhe hum rebelde , e teimosa purgação , com a qual se alterava algumas vezes consideravelmente a sua constituição. Além disso como a consequencia d'hum tal methodo he (particularmente nos temperamentos mui irritaveis) o enfraquecer o estomago , e visceras abdominaes , vem elle por este modo a dar occasião ás affecções hypondriacas. A estranguria , a hernia venerea , e outros molestos symptommas são tambem produzidos pelos purgantes drásticos. Esta pratica absurda tem por felicidade cahido em descredito. Hoje que estamos mais bem instruidos na doutrina da absorvencia , e que não ha certamente pessoa alguma versada em Anatomia , que intente desviar a materia da Gonorrhœa para a via do curso , porque se sabe , que ha de ser primeiramente absorvida pelos vasos lymphaticos , e introduzida na circulação ; com tudo he ain-

da assim mesmo tal o nosso afferro aos costumes velhos , por mais extravagantes que sejaõ , que de tempos a tempos se encontraõ alguns exemplos deste pernicioso methodo. Eu topei dous , não ha muitas semanas.

Os purgantes brandos , que eu proponho , são o sal de la Rochelle (*a*) , o maná , o tartaro solúvel (*b*) &c.

n'hu-

(*a*) O sal de la Rochelle , ou de Seignette , he hum sal medio composto do acido do cremor de tartaro saturado com o sal da barrilha , ou alcali mineral : o seu effeito vem a ser o mesmo do sal polychrestto , do de Clauber , do tartaro solúvel , &c.

(*b*) Todas as substancias salinas podem induzir alguma acrimonia nas ourinas , e augmentar assim a inflammação da urethra. Por esta razão he que Svediaur (L. C. p. 63.), e Cullen os reprovão. V. Elem. de Medicin. Prat. de Cullen. §. 1772. Será por tanto mais seguro , no caso de serem necessarios alguns purgantes brandos , não passar do maná , das polpas de canafistula , de
amei-

n'hum dose sufficiente para mover dous, ou tres curtos, e repetidos sómente de dous em dous, ou de tres em tres dias. O uso quotidiano dos electuarios laxativos, que alguns Praticos tem adoptado, tende a irritar continuamente a bexiga, e a prolongar a inflammação (a).

Consistem os remedios topicos principalmente em diferentes especies de feringatorios, compostos por mui diversas formulas, cuja acção depende, ora da sua qualidade mucilaginosá, e adoçante, ora dos seus principios detergentes, estimulantes, e adstringentes. Sendo estes remedios administrados por mãos habéis produzem de ordinario grandes vantagens; porém quando são

ap-

ameixas &c. Porém se no periodo da inflammação convem fazer uso desta classe de remedios, ou não: veja-se a nota (a) da pag. 19.

(a) Na composição destes electuarios entraão de ordinario alguns saes, sene, e muitas vezes outras drogas ainda mais drásticas, e estimulantes.

applicados sem alguma escolha, ou intempestivamente, podem occasionar males irreparaveis.

Os feringatorios mucilaginosos, e adoçantes devem abrandar a inflamação local (*a*). Se nelles entrar a dissolução do opio, diminuirá este a irritabilidade das partes, e produzirá consecutivamente hum effeito correspondente (*b*). He por tanto clara, e manifesta

(*a*) VanSvieten aconselha, quando he grande a dor, o feringatorio feito da mucilagem das pevides de marmelos, infundidas em agua rosada. L. c. §. 1458. p. 477. Se a inflamação for consideravel, alem dos feringatorios adoçantes, tem lugar os lavatorios emollientes, cataplasmas, cristeis, semicupios, &c.

(*b*) Eis-aqui o feringatorio, de que faço uso em casos taes. R.^e Opio puro grãos 5, ou 6; goma Arabia, ou de alcatira 4 oitavas, triture em almofariz de marmore, ajuntando pouco e pouco agua commun mea libra. M. D.

Re-

feita a utilidade destes medicamentos.

Hum seringatorio detergente , ou que obra sobre o muco da urethra , augmentando a sua secreção , e que por este

Refirirei as condições com que devem ser dados os seringatorios. Deve-se buscar hum seringa , cujo cano seja curto , e do mesmo diametro da urethra , a fim de a não offender na sua introdução : o embolo deve-se ajustar perfeitamente com o corpo da seringa , para que o liquido não reflúa , quando se quizer introduzir ; mas todavia deve mover-se facil , e suavemente. O doente comprimirá a urethra , acima do assento da gonorrhea , para que o liquido não communique o virus acima do dito lugar , o que poderá tambem evitar em parte , tendo urinado pouco antes de dar o seringatorio , e lavado assim a urethra. Depois de introduzir com muita suavidade o liquido sufficiente , deve conservallo por hum , ou dous minutos , apertando com os dedos a extremidade da urethra ao tirar da seringa , para que elle se não derrame logo. Esta injeção se repeti-

este modo expulsa o virus , que se acha misturado com o mesmo mucô , só pôde ter lugar como preservativo , antes que os symptomas da infecção se tenhaõ
ma-

petirá duas ou tres vezes successivamente , e terá o doente cuidado , de não urinar logo depois. Em 24 horas se pode repetir o seringatorio duas , tres , ou mais vezes , segundo a sua qualidade , e necessidade da molestia. Pelas mencionadas cautelas se poderá evitar a maior parte dos inconvenientes , que se tem attribuido aos seringatorios , e que VanSwiten refere no lugar citado.

Será tambem util o opio dado em cristeis emollientes , ou tomado pela boca , se a necessidade o pedir. Tem este remedio huma grande efficacia , para moderar as frequentes erecções , que costumão sobrevir nesta molestia , e que a aggravação consideravelmente , alem de serem muito enfadonhas. Ainda ha outro meio de as acautelar , que he o trazer o membro ligado para huma das coxas , e recommendar aos doentes , que se não deitem de costas , e em colchoens de lan , ou outros materiaes ,
que

manifestado. A dissolução d'hum caustico diluido como convém, terá esta virtude, e eu o tenho recommendado muitas vezes, porém o seu uso precisa de grande circunspecção (a). Se a dissolução

que elcandeção. A respeito do uso do opio deseja Nisbet, que este seja mais geral, e extensamente recebido na cura da Gonorrhea, lembrando-se de que a sua verdadeira, e primeira essencia consiste na irritação da membrana interna da urethra, da qual dependem todos os mais symptomas. V. Essai. sur la Theor. et la Pract. des Malad. Vener. De Mr. Nisbet. Tr. de l' Angl. p. 48. segg.

(a) Do seguinte modo he que o Doutor Fordyce faz uso deste remedio profylatico. R.^e De caustico commum da Farmacopea de Londres, ou pedra de cauterio huma oitava; dissolva n'huma libra de agua da fonte, e filtre.

Esta lixivia manda elle lançar n'huma tigelada d'agua, até que o seu lavatorio faça despegar o muco da boca sem huma grande dor. Esta mistura se seringa dentro da urethra, ou vagina, e se deixa alli demorar por hum minuto.

ção he muito branda não produzirá o effeito que se defeja ; sendo mui forte póde fer damnosa ; e eu lhe vi já produzir a retenção d'onrina. Depois de apparecerem os symptomas inflammatorios, devem temer-se quaesquer seringatorios estimulantes. Não poucas vezes terão elles occasionado a excoriação da urethra , sendo aconselhados por Practicos ignorantes , e temerarios (a).

Se

nuto. Ao resto do licor se ajunta huma colher da mesma lexivia, e com elle se lava a Glande , prepucio , e partes externas da geração, acabando por huma injeção, e lavatorios de agua morna. V. *Precis sur les Malad. Vener. Trad. de l' Angl. pag. 21.*

(a) Poucos annos ha que Mr. Clare Cel. Cirurgiaõ Inglez , publicou o seu Tratado sobre a Gonorrhea, no qual expõe como o remedio mais efficaç hum seringatorio composto da dissolução do Vitriolo branco em cozimento de linhaça , ou de raiz de malvaisco. A quantidade do Vitriolo deve ser variada , segundo

Se a inflammação continúa , tudo o que for estimulante , será prejudicial : a sensação dolorosa , que o seringatorio

as differentes circumstancias ; porem a dose ordinaria , que o Auctor propõe , he de dés graãos , dissolvidos em duas onças de cozimento , a qual quantidade será injectada fria por tres , ou quatro seringadas successivas ; e repetindo esta operação mais ou menos vezes em 24 horas , segundo os seus effeitos. O Traductor Francez julga grande a dose do Vitriolo , a respeito do qual deve haver huma grande prudencia , e recommenda , que antes se principie por quatro , ou seis graãos , e que se augmente á medida dos bons effeitos , que se notarem. Esta advertencia he judiciosa , e deve ser abraçada : haverá casos em que se deva começar ainda por menos. Manda M. Clare continuar este methodo logo desde os primeiros sinaes da Gonorrhœa , e promette que em menos de 5 dias se verá saõ o enfermo.

Aqui temos hum seringatorio detergente , em attenção ao estado da inflammação ,
con-

rio excita, occasionará a intumescencia dos testiculos, a difficuldade de urinar, a excoriação, e outros effeitos da inflammação augmentada. Se o licor, por sua adstringencia suspende a purgação, antes que se atalhe a causa virulenta

contra a opiniaão do nosso A., e de que não só Clare, mas alguns outros depois d'elle tem decantado a efficacia. Eu mesmo lhe tenho ja visto alguns successos felizes, mas advirto que este methodo deve ser posto em pratica logo que se manifestarem os primeiros symptomas da molestia, antes que a inflammação tome grande augmento, no qual estado não poderá deixar de ser damnozo hum tal ferigatorio. V. Method. Nouvell. & Facil. de Guer. la Mal. Ven. Trad. do Ingl. de Mr. Clare. A Londr. pag. 213. segg.

Hunter para explicar o como os ferigatorios estimulantes produzem os seus bons effeitos na Gonorrhœa, recorre á lei geral das sensações. Diz elle, que produzindo estes huma irritação de natureza differente, mais forte do que a irritação venerea, vem esta

lenta, o doente se exporá ao risco do gallico confirmado, e talvez a huma grande variedade de affecções locaes, assim como as obstrucções da urethra, os abscessos do interfemineo, de que effectivamente são muitas vezes seguidas semelhantes applicações, feitas intempestivamente.

Estan-

esta a ser por este modo suffocada, e destruida (L. C. p. 77.); porém eu acho esta razão alguma cousa metafisica, e precaria. Talvez que aquelle seringatorio não obre tanto irritando, como adstringindo, e corroborando; e que destas duas ultimas qualidades provenha o seu bom successo. A molestia consiste na irritação do canal da urethra, excitada pela acrimonia do virus alli introduzido: esta irritação alem de ser proporcionada á força do virus, tem tambem huma razão directa com a debilidade, e mobilidade dos solidos, ou com aquillo a que chamamos irritabilidade. Por tanto, tudo o que der huma maior firmeza, e constancia aos solidos, destroe, ou diminue a dita irritabilidade, e vem deste modo a oppor-se aos seus
pro-

Estando diminuida a inflammação teraõ lugar os feringatorios brandamente estimulantes, e adstringentes, e podem ser uteis. Esta diminuição da inflammação he proporcionada ao enfraquecimento da actividade do virus: geralmente fallando, quando os symptomas

progressos. Eis-aqui, segundo julgo, o que fazem os feringatorios adstringentes no nosso cazo. E como a inflammação he hum effeito, e consequencia da irritação, deve cessar, cessando esta ultima. Se ella porém tiver chegado a hum maior gráo, como entaõ supponmos hum grande cumulo de sangue dentro dos vasos daquella parte, e até mesmo algum derramamento deste liquido no tecido cellular, os adstringentes, cuja propriedade he apertar os solidos, devem fixar mais esta estagnação, e não podem deixar de ser prejudiciaes. Em tal caso deve variar a indicação, e dirigir-se mais ao symptoma, que he a inflammação, do que á primeira causa da molestia. Deveremos pois servir-nos dos laxantes, emollientes,

mas inflammatorios forem inteiramente dissipados, então deixa o muco de ser d'huma natureza infecta, e a sua secreção augmentada he hum puro effeito do relaxamento (a). Neste caso pois servi-

raõ

tes, e antistogísticos. Esta doutrina he conforme ao que se observa nas outras inflammacoes, as quaes no principio cedem muitas vezes aos adstringentes, e corroborantes, que são aconselhados por muitos praticos (V. Plenck Compend. Inst. Chir. Doctrin. Tumor. Class. 1. Tumor. inflamm. pag. m. 181. seg. Portal prec. de Chirurg. A Paris 1768. Tom. 1. p. 11.). He certo todavia, que os seringatorios de Vitriolo, e de semelhantes substancias obraõ tambem como detergentes, promovendo a evacuação do muco, em que reside o virus, como fica ja ponderado, e esta acção he certamente devida em grande parte á sua qualidade estimulante. Para a declinação da Gonorrhœa, depois de passada a inflammacão, vem estes seringatorios adstringentes, e estimulantes a ser outra vez admissiveis assim como o nosso A. nos vai logo dizer.

(a) Para mostrar quanto esta circumstan-

raõ os adstringentes brandos de apertar ,
e corroborar os orgãos secretorios , de
moderar a purgação , e de abbreviar
assim o tratamento da molestia. He lo-
go certo , que se nos limitarmos aos re-
me-

cia seja variavel , transcreverei aqui a seguin-
te passagem de Svediaur (L. C. pag. 58. seg.)
„ A maior parte dos homens imaginaõ , diz
„ este Auçtor , sendo isto ao meſmo tempo
„ attestado por muitos Auçtores de Medici-
„ na , que a *malignidade* (como elles lhe cha-
„ maõ) ou a virulencia d'huma Gonorrhœa ,
„ he sempre proporcionada á cor da materia que
„ se evacua ; e que logo que esta cor apparece
„ branca , deixa de ser contagiosa a sua purga-
„ ção ; porém a meu ver , he mui geral seme-
„ lhante conclusaõ : eu tenho notado em algu-
„ mas pessoas , que a cor enxofrada da materia
„ se conservava desde o primeiro , até o ultimo
„ dia. Os sinaes mais certos de se ter diminui-
„ do a virulencia da enfermidade , são a ces-
„ sação do ardor da urina , e a faculdade de
„ a reter taõ bem como no estado de saude ;
„ a diminuição da purgação , a qual toma hu-
„ ma

medios internos, póde huma gonorrhœa durar cinco, seis, ou mais semanas, quando aliás se curaria em 15, ou menos dias com o soccorro dos feringatorios.

D

Os

„ ma consistencia mais espessa, e glutinosa,
„ de maneira que se estende em fios entre os
„ dedos; e finalmente as erecções livres, e
„ naturaes, isentas de toda a dor, ou titilla-
„ ção. Por tanto, não tenho por certo, e evi-
„ dente, o estar completada a cura radical da
„ Gonorrhœa, de sorte que o doente esteja
„ seguro de não communicar a infecção, se
„ não quando cessa inteiramente a purgação, e
„ falta de todo a dor, ou calor, seja isto no
„ tempo da erecção, e expulsão do se-
„ men, ou em outra qualquer occasião. Po-
„ dem defengandar-se os doentes, que ainda
„ que a mudança da cor da materia, d'hum
„ amarello verdoengo para branca, seja em
„ geral hum presagio favoravel para a cura
„ da enfermidade, com tudo, não he isto hum
„ final certo, e seguro, de que o virus está
„ inteiramente evacuado. „

Os que convem applicar no principio são aquelles que humedecem, e lubrificaõ a superficie interna da urethra, e que obtundem o estimulo da materia virulenta; porém na declinação da molestia deve-se ajuntar a hum liquido mucilaginoso, e adoçante algum leve adstringente, havendo o cuidado de graduar a sua força, e acção pelo gráo da enfermidade, e irritabilidade do doente. Entre o grande numero de substancias que se costumão empregar nos seringatorios, nenhuma tem sido tão usada como o Mercurio, tomado debaixo de diversas fórmas. Todas as injectões mercuriaes são mais, ou menos adstringentes, e só a esta qualidade he que se deve attribuir a sua virtude, sendo aliás deduzida de falsos principios aquella que se lhe suppoem de corregir o virus venereo.

Os Calamolanos (a), unidos ao
mu-

(a) Mercurio doce.

muco que corre d'hum Gonorrhea, não são mais proprios para destruir a infecção do que o he o alvaiade, ou qualquer outra preparação mineral. Hum dissolução branda de sublimado corrosivo, de verdete, de pedra lipis, ou de outro qualquer estitico, o mais que póde fazer he apertar as aberturas dos feios da urethra, pois que nenhuma dellas póde mudar a natureza infecta da purgação. O mesmo podemos dizer do Mercurio cru, extinto n'hum mucilagem, ou gema d'ovo, e injectado dentro da urethra; o qual obrará quasi do mesmo modo, que o balsamo de cupaiva, ou outra injectão estimulante, porque este mineral nenhum imperio tem sobre o vicio venereo, excepto se for introduzido na massa do sangue, e alli adquirir certas modificações, que nós não conhecemos, e que provavelmente não serão jamais descobertas (a).

(a) Tem alguma verisemelhança a hy-

Finalmente a applicação local do Mercurio não pôde produzir outros effeitos mais, que aquelles que dependem da sua qualidade estimulante, e adstringente, porque, não sendo elle absorvido pelos vasos de dentro da urethra, não pôde entrar no systema geral da circulação; e ainda no caso que alguma porção alli chegue, será esta tão diminuta, que não pôde ter efficacia

potheſe de Mr. Mittie, o qual ſuppõe, que ſendo o Mercurio introduzido em os noſſos vasos, deſcompõe huma parte do ſal ammonia- co animal para ſe unir ao ſeu acido, e formar com elle hum ſal mercurial. Neſte eſtado, diz Mittie, he que o mercurio poſſue a faculdade de deſtruir o virus venereo, a qual em nenhum outro lhe compete. Pelos phenomenos, que eſte Eſcritor obſerva no tempo da ſua applicação ſe cança em moſtrar, que a ſua hypotheſe he verdadeira, e daqui tira alguns corollarios praticos, principalmente a reſpeito do melhor modo de applicar eſte remedio.

As

cia alguma (a). Eu declaro , que a minha intenção não he a de reprovar os se-

As preparaçoens acido-salinas , isto he , o mercurio combinado com hum acido , são as que elle prefere &c. porém a cousa ainda está mui longe da evidencia , que elle imagina , e que com effeito era necessaria , para destruir inteiramente a opiniaõ do nosso A. V. Etio-
log. Nouvell. de la Salivation , &c. par Mr. Mittie , Paris 1777.

(a) Quem sabe se essa mesma pequena quantidade será sufficiente para destruir este virus local , e estorvar que alguma porção absorvida se actúe , e inficione todo o systema? A experiencia tem mostrado , que hum bem pequena porção de mercurio basta para completar a cura do gallico , com tanto que ella obtenha aquellas modificaçoens , que o A. pouco antes suppoz necessarias , para que este mineral pudesse ser efficaz. Quantos gallicos , e n'hum estado bem adiantado tem ficado inteiramente saõs , só com a applicação de hum até dous grãos de sublimado corrosivo , dado pelo methodo de VanSwieten , ou outro

feringatorios, feitos com as preparaçoes mercuriaes, mas sómente condenar os principios em que se estribaõ os Practicos, que até aqui tem feito uso delles.

O estímulo, que produzem os calamolanos, sempre me pareceo muito efficaç; e nas mulheres, quando só a vagina era o assento da molestia, depois de limpas estas partes, me completaraõ

tro semelhante? Descontemos o espirito de sal marino, que entra nesta composiçaõ, e ver-se-ha quã diminuta vem a ser a quantidade de azougue, que constitue este sal mercurial. Tambem não deve ser mui grande a quantidade de azougue, que se introduz no corpo pelo methodo de Mr. Clare, o qual consiste em tomar na ponta d'hum dedo, humedecido de saliva, meio, ou hum grão de calamolanos, e esfregar as partes interiores das bochechas ao redor do fitio, aonde se abre o ducto da Glandula parotida, chamado de Stenon: e não obstante isso este A. e alguns outros depois d'elle attestaõ terem conseguido muitas curas de gallico por este modo. V. L. C.

raõ toda a cura as fricçoens mercuriaes repetidas.

Se parecer escusado dar o Mercurio internamente, visto que a Gonorrhea de ordinario naõ passa d'huma doença local, convenho nisto, e confesso que muitas vezes a tenho curado sem este soccorro. Tenho além disso encontrado muitos doentes, cuja constituição se achava bastantemente arruinada pelo uso demasiado deste mineral, ao mesmo tempo que a Gonorrhea havia empeiorado consideravelmente. Huns tinhaõ huma rebelde purgação, e outros huma grande variedade de enfadonhos symptomas. Por esta razão aquellas vezes que faço uso do Mercurio, he mais para acautelar o perigo da absorvencia, do que para apressar, e adiantar a cura. Nunca me sirvo delles quando a infecção, e a inflammação, e seus symptomas, são leves, e sobretudo se o doente he de hum temperamen-

mento fraco , laxo , e irritavel. Se he porém violenta a purgação ; se a inflammiação he forte , e mui alto o affento da molestia dentro da urethra , neste caso me aproveito constantemente dos mercuriaes , dados em pequenas doses ; e na fórma mais accommodada á constituição do enfermo (a).

As

(a) Hunter , Svediaur , e todos os Practicos modernos mais famigerados , seguem que o mercurio dado interiormente nos casos de simples Gonorrhœa , não obra senão como purgante , e de nenhuma forma atacando o virus V. Hunt. L. C. p. 73. Sved. L. C. p. 39. segg.

O primeiro destes Auctores observou alguns casos , em que a Gonorrhœa foi contrahida no mesmo tempo , em que os doentes estavam usando do azougue , por causa de cancrios venereos , ou Gallico confirmado ; e não obstante isto , teve a costumada difficuldade em se curar. Ibid. p. 74. He todavia opiniação de Svediaur. , que posto que este mineral , to-
ma-

As pilulas mercuriaes do Despenfatorio de Londres , em razão da Therebentina , que entra na sua composição , podem passar pelo corpo sem serem

mado pela bôca como alterante , venha a ser inutil , e escusado nas simples , e benignas Gonorrheas , não deve o mesmo affirmar-se da sua applicação local , a qual tem as mais das vezes achado proficua. Elle se serve ordinariamente das unçoens , feitas sobre o perineo , ou nas virilhas , e interior das coxas. Eu advirto ainda assim , que estas mesmas applicações , se não fação no auge da inflamação , porque , ou pouco , ou muito sempre são estimulantes. Mr. Villars n'huma nota á Obra citada de Fordyce , diz mais : não quer elle , que a applicação do mercurio tenha lugar , senão depois de bem mitigada a inflamação ; e sem esta cautella afirma , que o dito mineral , augmentando o vigor dos vasos , pode supprimir a purgação , e disfarçar , ou encobrir o gallico , em vez de o curar. Pelo que pertence porém ao uso interior do mercurio , não deixara este de ser

rem dissolvidas (*a*), nem produzirem algum effeito. Porém o azougue extinto com mel, e reduzido a pilulas, conforme a ultima edição da Farmacopêa de Edinburgo, he huma prepara-
ção

ser tambem util, e necessario quando occorrerem aquellas circumstancias, que ja apontamos, e vem a ser: se a Gonorrhœa he acompanhada de chaga no interior da urethra: se tem sido desprezada, mal tratada; ou muito rebelde, de maneira que a sua cura seja demasiadamente prolongada. Nestes casos sempre ha hum grande risco de se inficionar o todo; e por isso a applicação do mercurio seja externa, ou interna, feita com as precauções necessarias, he indispensavel.

(*a*) O Doutor Cullen de Edinburgo, e muitos outros Praticos virão acontecer isto algumas vezes ás pilulas d'huma consistencia dura, e tenaz, feitas de balsamos, gomas, &c. Por cuja razão adverte Pichler, que estas pilulas devem receitar-se em pequena quantidade, para que se não endureçam muito com a diuturnidade. V. Method. Formul. Med. conscrib. pag. 34.

ção suave, e efficaz. Eu a tenho visto dissipar accidentes, que haviaõ resistido ao mesmo sublimado corrosivo. O mercurio desta maneira passa pelo curso sem irritar, nem damnificar as visceras. Deve-se comtudo evitar, que elle accommetta a bôca. Em geral eu anteponho esta formula mercurial aos proprios Calamolanos, que he de todas as composições chímicas deste genero a mais suave, e se póde dar ao deitar da cama desde graõ e meio até tres, entremettendo-lhe algum purgante brando, quando se julgar conveniente, para acautelar a salivação.

Naõ havendo cancro venereo, bubão, ou qualquer outra apparencia de vicio geral, vem a ser imprudente a applicação do sublimado, do mercurio calcinado, e de outras preparaçoes muito acres.

Aqui termino as minhas observações sobre o tratamento geral da Gonorrhæa, e vou accrescentar-lhes algumas

mas advertencias a respeito dos symptomas particulares , ou resultados desta molestia , quando ella chega a hum gráo violento , ou he mal dirigida. São estes a hernia gallica , o esquentamento encabrestado , o encordio , a fymofe , a parafymofe , os cavallos , os apertos , ou estreitezas da urethra , e as purgaçoens rebeldes. Eu tratarei succintamente de cada hum destes symptomas , pela mesma ordem, com que os referi (a).

§. I.

(a) De todo o decurso destas sabias observaçoens , fundadas , não só na pratica do A., mas na de todos os modernos , que tratarão melhor desta doença , e que indagaráo com maior exactidaõ a sua natureza , se vê , que o Esquentamento he huma verdadeira inflamação da urethra , excitada pela acrimonia do virus alli introduzida , e que a esta se deve dirigir toda a indicação curativa. Como ella porém costuma variar muito nos seus symptomas , progressos , e duração segundo a variedade dos temperamentos , e constituições ,

§. I.

Da Hernia Venerea , ou tumor do Testiculo.

A Té aqui foi sempre opiniaõ common , que a Hernia gallica , ou inchaço do testiculo , como ordinariamente lhe chamaõ , era occasionada pelo transporte da materia morbosa , que cahia
no

çoens , he por esta razão , que a sua cura deve tambem ser variada , segundo estas diferentes circumstancias. Vejamos o que diz Hunter na sua excellente Obra , já mais do que huma vez citada. „ Os methodos com
„ que até agora se pertendeo curar esta mole-
„ stia , e que tem sido seguidos pelos diffe-
„ rentes homens de profissão , são de dous ge-
„ neros ; pertence hum aos remedios inter-
„ nos , e outro ás applicaçõens locaes. Mas
„ por qualquer destas vias , que a doença se
„ haja de tratar , deve a nossa attenção enca-
„ minuar?

no testiculo depois da supressão da evacuação gonorrhoeica. Astruc, e depois d'elle Mr. Fabre, hum dos ultimos AA. Francezes, que escreverão sobre as enfermidades venereas, a considerão do mesmo modo, e por isso lhe chamaõ *Esquentamento cabido no escroto*. (Chau-
de

„ minhar-se mais á natureza da constituição
„ ou áquelles symptomas de molestia que
„ lhe dizem respeito, quer elles existão nas
„ mesmas partes, quer em outras que com
„ ellas tem conexão, do que á mesma en-
„ fermidade.

„ Esta constituição deve conhecer-se prin-
„ cipalmente pelos effeitos locais do dito
„ virus, os quaes variaõ tanto entre os dif-
„ ferentes povos, que requerem huma gran-
„ de variedade de tratamentos. Todavia tem
„ isto sido tão pouco attendido, que cada
„ qual trabalha por combater os symptomas
„ immediatos, como se possuísse hum reme-
„ dio especifico para a Gonorrhoea „ (Pag.
70.). He impossivel darmos aqui conta de to-
das

de pisse tombé dans les Bourses): porém a Anatomia não nos tem demonstrado caminhos , por onde esta materia retrograda possa passar ao testiculo. Se he recebida pelos vasos absorventes , deve mais depressa ser conduzida a virilha , e produzir alli hum bubaõ ; e se he que o tumor provém da materia , introduzida no systema geral da circulação ,

das estas circumstancias , as quaes devem variar quasi infinitamente. Mas deve-se colligir , quaõ difficil he o tratamento desta cruel enfermidade , e que elle não pode ser bem dirigido , senão por Professores habeis , que possuão todos os conhecimentos scientificos para distinguirem estes differentes casos. Defenganem-se pois os Charlataens , que prometterem , e se arrojaõ a curar esta doença com hum particular , e unico remedio , que haõ de fazer muito mais estragos , do que curas.

Depois que cessa a inflammação , cessa tambem muitas vezes a purgação , e o doente se deve reputar curado , no caso de haver

fi-

ção, a qual attaca juntamente o testiculo, neste caso deveria esta glandula, como orgão da secreção, ser a primeira que padecesse. Porém o certo he, que esta inchação, que he huma das mais terriveis consequencias da gonorrhea, procede meramente do progresso da irritação, e inflammação (a).

Quan-

fido methodicamente dirigido: mas se a purgação continuã, toma então o nome de Gonorrhea habitual.

Se esta he acompanhada de alguma exulceração, estreitezas da urethra, intumescencia da prostata, &c. Deverá a cura encaminhar-se a estas causas. As mais das vezes porém he ella hum puro effeito do relaxamento, como adiante veremos, aonde se dará o modo de a tratar.

(a) O maior fundamento que achão aquelles AA. para se capacitarem da sua opinião, he que o tumor do testiculo succede de ordinario á suppressão da Gonorrhea, e viceversa á proporção, que esta se restitue, e appa-

Quando o affento da Gonorrhœa occupa hum pequeno espaço na extremidade da urethra , raras vezes acontece esta complicação ; porém se a inflamação se prolonga até o alto deste canal , junto dos orificios dos vasos *ejaculatorios* , então póde estender-se até o testiculo , e comprimindo a abertura do vaso *deferente* , embaraçar o curso do esperma para as bexigas seminaes. Eis-aqui porque vemos constantemente começar a inchação pelo vaso *deferente* , e descer pela *epididymide* até o testiculo , o qual muitas vezes deixa de ser comprehendido. Este accidente tem tão pouca connexão com o corrimento da urethra , que algumas vezes subsistem ambos juntos (a). Elle procede pela mai-

E

or

apparece a sua purgação , desvanecese a inchação do testiculo. Porem isto mesmo pode succeder por effeito das causas que dá o nosso Auctor.

(a) VanSwieten dá-nos hum destes exemplos. V. Comment. ao §. 1450 de Boerhaav.

or parte de excesso de bebida, de algum exercicio violento, especialmente acavallo, de toque de ar frio, ou de nos entregarmos aos deleites venereos (a). Para se ver, que a hernia venerea he hum puro effeito da irritação basta observar, que o estímulo d'humavelinha he capaz de a produzir, e que ha alguns exemplos de affecções, e intumescencias de hum, ou ambos os testiculos em consequencia da operação lateral da pedra.

Sendo este tumor de reccar em todas as Gonorrhœas, principalmente quando a inflammação he mui forte, deve haver a precaução de trazer os testiculos suspensos por meio d'hum suspensório.

(a) A causa mais ordinaria desta molestia são os feringatorios irritantes, e adstringentes, e os remedios balsamicos, ou purgantes fortes, applicados intepestivamente, e antes de se dissipar o virus, e inflammação da Gonorrhœa.

torio (a). Aquelles que ao principio desprezaõ o seu uso, não o podem de modo algum escusar, depois que a inchação do testiculo se manifesta; por ser hum dos pontos mais essenciaes do seu curativo. Em quanto a inflammação he violenta, deve o doente conservar-se n'huma posição horisontal (b). A sangria convem geralmente, e deve logo praticar-se apenas a molestia se patentêa: a primeira será de 8, ou 10 onças de sangue, e he preciso repeti-la no caso que os symptomas não cessem, muito mais se o doente for plethorico (c). Devem-se evitar com cuidado todos os mercuriaes; porque o seu estimulo não poderá deixar de prejudicar, n'huma molestia puramente inflammatoria, e

E 2

inde-

(a) O suspenso rio he indispensavel para aquelles, que já padecerão esta molestia.

(b) Deve ficar de cama.

(c) A sangria deve ser no braço, e do lado enfermo, podendo ser.

independente do virus. Os purgantes draísticos não serão menos nocivos por causa da irritação que excitão ao redor do collo da bexiga (a). Muitos Praticos aconselhaõ os vomitorios, porém estes obraõ ás vezes com muita violencia, e a sangria he o principal remedio. São convenientes os banhos mornos; porém as cataplasmas, e fomentações relaxaõ os tegumentos, sem contendere[m] com a causa da enfermidade (b).

As

(a) O nosso Madeira tem razão em re-
cear a purga, ainda depois de passada a in-
flamação, porque pode, e acontece excita-
la de novo. Requer este Auctor que se dei-
xe passar 40 dias antes da purga; e o seu con-
selho he prudente, bem que em alguns ca-
sos se possa reduzir este intervallo a menos
tempo. V. Mad. Illustrad. Lisb. 1715. pag.
95.

(b) Eu não sei que haja remedio mais
proprio para pacificar, e diminuir huma in-
flamação verdadeira, excitada por huma ir-
rita-

As applicaçoens frias , taes como os pannos molhados em vinagre , e renovados a miudo (a), tambem são mui proveitosas.

A

ritação , do que as cataplasmas anodynas , e emollientes. He verdade que Svediaur achou nellas tão pouca efficacia , que as desprezou , e quer que se faça antes uso de hum suspenforio secco , depois que o doente sahir d'hum banho morno , no qual se demorasse por espaço de meia hora , ou tiver tomado o seu vapor por meio d'huma cadeira forada. Acha elle mais uteis estas cataplasmas applicadas sobre o membro viril , ou urethra (L. C. p. 104.). Hum remedio que me parece mui proprio , e o aconselha Madeira , he a agua rosada , com igual parte de leite de peito (ou qualquer outro) , applicada em panninhos golpeados sobre a parte. V. L. C. pag. 94.

(a) O acido do vinagre he estimulante , e tem grande acção sobre a sensibiliissima cutis do escroto , e por isso não vejo como pode convir n'huma molestia , filha inteiramente de irritação. Sydenhaõ , VanSwieten , e outros aconselharaõ cataplasmas feitas em

vi

A *epididymide* conserva algumas vezes depois da hernia venerea huma intumescencia , que póde durar muitos annos ,
sem

vinagre , e agua nesta doença , mas a experiencia as tem feito desprezar. Semelhantes applicaçoens teraõ apenas lugar muito no principio como repercussivas , ou depois de cessar a inflammacão , se bem que entaõ mesmo as julgo suspeitosas. Applicaçoens mais doces , e brandemente adstringentes , e corroborantes , seraõ mais uteis. A agua vegeto-mineral , ou a sua cataplasma he desta natureza. Internamente se fará uso de diluentes , e antistologisticos : v. g. emulsoens nitradas , forros de leite , &c. e huma mui apertada dieta , inteiramente vegetal. Os cristeis emollientes saõ muito necessarios para facilitar a saída das fezes , as quaes podem servir de novo estimulo , e para fazerem as vezes de hum banho interno. Svediaur os manda tomar com opio para abater a irritabilidade das partes , e se persuade de que a essencia da cura está nesta applicação , que o acaso lhe descobrio. V. L. cit. p. 102. seg. Os opiados tambem saõ

fem que o doente seja incommodado (a).

§. II.

Do Esquentamento encabrestado.

O Esquentamento encabrestado, ou erecção involuntaria, e dolorosa do membro viril, he originada da impressão que faz o virus venereo sobre a membrana inflammada da urethra, e póde geralmente ser apaziguada por meio dos opiados, e dos seringatorios cal-

recommendados por Hunter, Nisbet, &c., e se podem igualmente dar pela bôca.

(a) Este he o caso d'hum scirro do escroto, no qual a hernia degenera algumas vezes. São então proficuos os mercuriaes internos, e externos, os purgantes, etc. VanSwieten aconselha para estas induaçoens huma onça de olhos de caranguejos diluida em huma canada de vinho Austriaco, de cuja mis-

calmantes. Deve-se dar á hora de recolher hum graõ de extracto Thebaico (d'opio), ou 25 gotas de tintura Thebaica (em licor accommodado), e ferir na urethra hum liquido mucilaginoso, misturado com opio. São mui uteis as sanguiugas applicadas junto do
assen-

tura deve tomar o doente 3, ou 4 colheres de manhã, e de tarde; e este remedio tem sido confirmado pela experiencia. He bem semelhante a elle, e talvez mais efficaz ainda, o que Plenck recommenda no seu *Novo Systema dos Tumores*, o qual vem a ser o licor da terra foleada de tartaro, diluido em agua de flor de sabugueiro. As cataplasmas, e emplastos resolutivos, mercuriaes, saponaceos, de gommas-rezinas, cicuta, etc. devem-se applicar na parte. Mr. Nisbet manda tambem dar internamente os opiados, e particularmente a cicuta, combinada com os mercuriaes. O seu designio he contender ainda com a primeira causa da molestia, que vem a ser a irritação, e estado espasmodico da parte. V. L. C. p. 86. segg.

assento da inflammação; porém o que he mais conveniente, he conservar a parte de modo, que a erecção não possa ter lugar. Este symptomata pode durar mais tempo, do que o ardor, e calor da urina, e persistir ainda mesmo depois que a inflammação, e os outros accidentes da Gonorrhoea houverem desapparecido. Eu tenho visto esta molestia, que se pode considerar como espasmodica, apparecer, e desapparecer pelo decurso de muitos mezes, em cujo caso he a quina o melhor remedio: mas ás vezes he tão rebelde, que a tudo reziste, e só diminue gradualmente depois que se deixa entregue á natureza (a).

§. III.

(a) A Gonorrhoea encabrestada conhece duas causas, huma inflammatoria, e outra espasmodica. Esta ultima cura-se com antispasmodicos, opiados, etc., e quando se faz chronica, e periodica só os corroborantes podem segurar a sua cura; assim como os banhos frios

frios, a quina, o ferro, e a mesma natureza, deixando nós de a fatigar com o uso de remedios, dicta, etc. A causa porem mais ordinaria, principalmente no estado inflammatorio da Gonorrhœa, vem a ser a inflamação da substancia cavernosa da urethra, ou cumulo, e derramamento de humores dentro dos seus vasos, e cellulas, que a intumece, e priva de poder estender-se. A cura desta especie de encabrestamento deve consistir em evacuaçoens sanguineas, especialmente as locaes, cataplasmas, e lavaterios emollientes, banhos tepidos, antiflogisticos, etc. Tem-se visto desapparecer este symptoma promptissimamente, em consequencia d'huma hemorrhagia da urethra, o que prova a necessidade das sangrias locaes. Se succeder porem que elle exista depois de vencida a inflamação, será neste caso attribuido á adherencia das cellulas por effeito da viscosidade da lynfa coagulavel, que nellas se derramou; em cujo caso se notará huma dureza preternatural naquelle sitio da urethra, em que a molestia tem o seu assento. As unturas mercuriaes, applicadas sobre a parte enferma, devem

§. III.

Do Bubaõ, ou Encordio. (a)

O Bubaõ, ou inflammação das glandulas lymphaticas da virilha, deve a sua ori-

vem ter entao o principal remedio. V. Hunter L. C. p. 49, e 89.

(a) Para que melhor se distingaõ os buboens gallicos dos que o não são, quando não precedaõ, ou concorraõ alguns outros symptomas mais decisivos, advertiremos, que os gallicos costumão crescer, e madurar-se mais rapidamente; são mais dolorosos, e o seu tumor he mais circunscripto, passando pouco alem do corpo da Glandula, ou Glandulas atacadas. A côr da sua inflâmação he de hum vermelho claro. Madeira recorre tambem á desproporção destes symptomas com as causas que produzem os outros tumores, alheios da qualidade gallica; a saber, não preceder a febre, nem haver sinaes de enchimento, ou cacochimia, etc. V. Madeira L. C. Cap. XII. n. I.

origem a huma irritação ; e basta o estímulo de huma velinha , para o produzir accidentalmente (a). Todavia a sua
cau-

(a) Fordyce , Svediaur , Hunter , e Nisbet defendem com vigor , que ha buboens nascidos da simples irritação , que soffrem na sua origem os vasos lyntaticos que vão terminar nas glandulas inguinaes. Esta especie de buboens parece que não foi ignorada do Illustre Annotador do nosso Madeira , o qual nas annotações do Cap. XII. n. 1. pag. 87 se exprime da maneira seguinte. „ Bem pode „ succeder , que sem estar o Gallico comunicado á massa sanguinaria sobrevenhão „ encordios ás Gonorrhœas , e pustulas das partes obscenas , assim porque com as dores , „ que causão estes achaques , ha concurso de „ humores ás partes baixas , com os quaes „ se enchem as glandulas das virilhas , e fi- „ caõ tumorosas ; como porque do mesmo contagio da Gonorrhœa , e pustulas , ou carie- „ çoens se elevaõ alguns effluvios acidos , „ etc. „ Desculpemos a sua má Pathologia em attenção á ignorancia do seu tempo ,
com

causa mais ordinaria he a absorvencia do virus da superficie interna da urethra,

com tanto que fiquemos convencidos de que elle teve algum conhecimento deste genero de buboens sympathicos (assim lhes chamaõ os AA. ha pouco citados), que não provém da absorvencia do virus. Os sinaes com que estes buboens se distinguem dos idiopathicos, não são evidentes; pelo que, ainda que tenham de costume desaparecer em poucos dias, tirada, e vencida que seja a primeira causa, que lhes deo nascimento, com tudo, como he equivoco o seu diagnostico, devemos seguir o methodo mais seguro, que vem a ser o que compete aos idiopathicos, de que ao diante se ha de fazer menção. Segundo Nisbet, são os sympathicos muito molles até certo tempo; e ainda que o seu volume tenha chegado a grande augmento, com tudo a dor he pouca, ou nenhuma: acompanhaõ ordinariamente o periodo mais forte, e agudo da Gonorrhœa, quando os seus symptomas estão no maior auge. V. Nisb. L. C. p. 204.

thra , ou da chaga d'hum cavallo (a). Se he possível que o bubaõ provenha da infecção geral da massa dos humores , deve acontecer isto mui raras vezes (b).

A' proporção que o bubaõ se inflamma succede ordinariamente diminuir a Gonorrhœa ; por cuja razão se tem imaginado ser o transporte da materia a causa desta enfermidade ; porém esta he em mui pequena quantidade. A passagem , ou mudança da inflammação da urethra para as glandulas inguinaes , deve ser antes contemplada como causa immediata da molestia.

A

(a) São os cavallos a origem mais fecunda dos buboens, no qual caso mui poucas vezes deixão de ser idiopathicos.

(b) Chamaõ-se *Secundarios* estes buboens, que vem em consequencia do virus geral, para se distinguirem daquelles que produz humma infecção particular antes de se communicar ao todo; os quaes são por isso chamados *primitivos*.

A opiniaõ geral sobre o tratamento do bubaõ, he que apenas elle apparece, se promova a sua maturação: recea-se a resolução pelo motivo de que a materia, sendo introduzida no sangue, vai produzir o gallico confirmado (a). Mas nós com bem pouco provar-

(a) Esta opiniaõ não he tão geral, que não fosse refutada ha muitos annos por alguns homens sabios. Bastará para prova da nossa asserção citarmos as palavras de Francisco da Fonseca, Illustrador de Madeira, e Medico d'El-Rei D. Joaõ V. Na primeira annotação ao Cap. já citado diz elle. „ Erra „ quem cuida, que chegando a madurar hum „ encordio, e a romper-se, por elle se li- „ vraõ os gallicados do contagio que contra- „ hiraõ; o que he tanto pelo contrario, que „ do mesmo apostema, em qualquer estado „ que seja, se pode inficionar mais o san- „ gue, recebendo delle algumas particulas „ contagiosas, que facilmente no seu circulo „ se lhe communicão. „ E na annot. 2. „ So- „ lici-

varemos , que este inconveniente succede mais depressa quando se promove , do que quando se evita a maturação (a). O bubão no seu principio , bem co-

„ licitar a maturação he neste achaque pou-
 „ co importante. O que nelle convem muito
 „ mais he satisfazer a indicação de extinguir
 „ o contagio , de que procedem os encordios ,
 „ ou elle esteja communicado ao sangue , ou
 „ occupe fomite as partes baixas. „ pag.
 86. e 87. Donde se vê que a pratica , e sen-
 timento deste grande homem era conforme em
 tudo ao de hoje.

(a) Esta doutrina he hoje universalmente abraçada. Nisbet manda continuar a indicação de resolver ainda depois de se patentear alguma materia , e fluctuação , o que com tudo deve ter suas limitações ; porque não podendo algumas vezes deixar de ter lugar a suppuração , o methodo de resolver neste caso retardará o exito da molestia , assim como adverte Hunter. Por tanto , só no caso da suppuração ser mui pouca , e de ir o tumor em diminuição , com pouca ou nenhuma dor , e inflamação , he que a indicação de resolver se poderá continuar.

como a Gonorrhœa, he huma mœra afecção local. As tunicas dos vasos lymphaticos, que se encaminhaõ á glandula, e a mesma glandula sãõ irritadas por hum pouco de virus, que occasiona huma inflammação independente do habito, e constituição do corpo. Se acaso pois, procuramos vencer esta inflammação, sollicitando a resolução do pus, que pôde ser esteja já formado dentro do tumor, he verdade, que se expõem o enfermo ao perigo da infecção, porém ao menos naõ he esta sensivel, quando a bom tempo se consegue a resolução do bubaõ, e por cautela se faz uso de alguns remedios mercuriaes.

Vejamos agora o que acontece, quando a glandula se traz á suppuração: soffre o doente hum tratamento longo, e penoso, e o perigo da infecção vem a ser tanto maior, quanto mais dilatado for o progresso da maturação. He

F

inevi-

inevitavel a absorvencia, no tempo em que a materia se forma, principalmente depois que o tecido cellular, que cerca a glandula, começa a ser inficionado. E que diremos da espagosa chaga, que resta depois de aberto o abscesso? Não he esta huma fecunda origem da infecção? He logo claro, que a prompta resolução destes tumores deve ser sempre a nossa primeira indicação; para o conseguimento da qual se costuma ordinariamente (fazer uso das uncturas mercuriaes no interior da coxa (a), com o intuito de que o azougue, sendo absorvido pelos vasos lymphaticos, e passando ao travez da glandula, possa destruir o vicio venereo, porém esta idéa, como já advertimos fallando dos

ferin-

(a) Nisbet parece antepor a raiz do membro para a applicação destas unções, o que com effeito deve ter lugar, quando o bubão occupa a parte superior da virilha, junto do ligamento de Puparcio. V. L. C. p. 214.

leringatorios, estriba-se em hum falso principio. Este mineral obra puramente pelo seu estímulo, o qual promove a absorvencia; e pôde além disso augmentar a inflammação, adiantar a maturação, e produzir finalmente, o que intentamos evitar (a). Devemos

F 2

por

(a) Não obstante estas objecções, a pratica das fricções mercuriaes applicadas na parte interna das coxas, ou perna do mesmo lado, he geralmente abraçada por todos os sabios deste seculo. Deve-se ajudar este methodo com as devidas, e necessarias, evacuações, ou sejaõ de sangrias, ou de purgantes, e as applicações locaes, principalmente se a inflammação for mui forte, em cujo caso será necessario differir por alguns dias o uso das unturas, até que a inflammação tenha perdido a sua intensidade. Svediaur he deste mesmo sentimento, e não quer, que o uso do mercurio, seja externo, ou interno, tenha lugar no estado inflammatorio do bubão, ou de qualquer outra mo-

por tanto tomar certas precauções, contra os effeitos destas unturas, e eu prefiro as applicações frias (a) sobre a parte, ao unguento mercurial, e a todo o genero de fomentação, e cataplasmas (b). O vomitorio porém he o pri-

molestia venerea. Em hum tal periodo nunca elle vio bons effeitos do mercurio, ao mesmo passo que muitas vezes lhe havia notado terriveis consequencias. V. L. C. p. 197.

(a) Gontessa Svediaur, que estas applicações frias juntas ao uso dos vomitorios estavaõ em voga para resolver os buboens; mas que a elle nunca lhe fora necessario recorrer a hum tal methodo, fervindo-se das fricções mercuriaes. V. L. C. p. 191. seg. Nos casos de maior rebeldia aconselha tambem a applicação d'huma ventosa secca sobre o tumor; a qual ja foi recommendada por Madeira, posto que o seu Annotador a refutasse. V. Madeira L. C. p. 84, e 90.

(b) Svediaur tambem confia mui pouco nas applicações locaes, ainda que para tranquill-

primeiro de todos os remedios : eu tenho visto muitos buboens completamente

quilizar o espirito do enfermo costuma fazer uso de algum emplasto mercurial. L. C. pag. 191. Como se sabe, pelas descobertas que se tem feito relativas aos vasos lymphaticos, que mui poucos, ou nenhum destes vem terminar nas glandulas inguinaes, tendo origem na pelle que as cobre, he por esta razão, que se conhece o pouco fructo que se deve tirar das applicaçoens mercuriaes sobre a mesma parte, alem de concorrerem estas muito mais para excitar, e augmentar a inflammacão topica. Sallart he dos Auctores, que combate com maior força as formas emplasticas; e a ellas attribue a maior parte dos pessi-mos successos que observamos nos buboens mal suppurados, ou resolvidos. Por cuja razão quer que deixemos livre á natureza o caminho de huma destas terminaçoens, a qual ella deve escolher por si mesma, e seguir sem algum estorvo. Ao Professor (diz elle) só importa a cura mercurial para destruir o virus venereo. V. Meth. Accur. penit. eradic.

Luem

te resolvidos por meio do vomitorio ,
ainda depois que a materia se havia for-
mado (a).

Decidamos em fim se deve ser o
bistori , ou o cauterio o meio de abrir
este

Luem Ven. Cap. 5. Com tudo isso , quando
a dor e inflamação for mui activa , julgo ,
que não nos podemos dispensar de fazer uso
das cataplasmas emollientes , e anodynas. Nos
outros casos , seguindo nós a indicação de re-
solver , tambem não estou em que possa ser
infrutifera a cataplasma vigeto-mineral de Mr.
Goulard , que vem a ser o pão fervido na
agua deste nome até tomar a devida consisten-
cia. O A. decanta muito o seu uso , e até lhe
attribue a virtude de resolver aquelles buboens ,
que já dão sinaes de maturação formada , o
que prova com repetidas observaçoens pra-
ticas. V. Oeuvr. Chir. de Mr. Goul. T. 2.
Cap. 3.

(a) O acaço patenteou a Hunter os bons
effeitos dos vomitorios sobre os buboens já fu-
purados , e que estes eraõ capazes de os ter-
minar pela resolução. V. L. C. p. 272. E hoje
saõ

este tumor , quando elle tem chegado á suppuração , o que succede mui repetidas vezes , a pezar de quaesquer esforços , que se fação para o embaraçar (a). Não poderemos porém terminar

saõ elles recommendados por muitos Praticos.

(a) Se depois d'algum uso de unturas , e dos remedios propostos , cresce o tumor , em vez de diminuir , e se faz mais vermelho , e doloroso , convencer-nos-hemos de que a maturação he indispensavel , e então mudando de indicação passaremos a promover a com os remedios proprios da qualidade da inflammação , que se apresentar , da qual daremos aos nossos Leitores huma succinta idea. São duas as especies de inflammaçoens , que de ordinario se encontrão na pratica : huma , que chamaremos nervosa , ou constitucional , por ser em grande parte filha do temperamento sensivel , e irritavel do sujeito ; e outra humoral , produzida pelo infarcto , ou cumulo de humores na parte leza. Conhece-se a primeira pela pequenez , e ligeireza do pulso , e temperamento particular do enfermo

nar esta queſtaõ , taõ debatida entre os Praticos , os quaes ainda a ſeu reſpeito naõ tem concordado , ſem diſtinguirmos o bubãõ , que provém d'huma me-
ra

mo , e pede huma dieta mais larga , e reſtaurante , quina , opiados , &c. na qual ſerá pernicioſo todo o genero de evacuaçaõ. A ſegunda comprehende outras duas eſpecies ; huma ſanguinea , ou verdadeira , mui doloroſa , e as vezes taõ activa , que chega a ameaçar gangrena , a qual ocorre nos ſujeitos ſanguineos , plethoricos , e robuſtos , e ſe deve combater com remedios freſcos , e calmantes , dieta tenue , ſangrias geraes , e topicas , banhos mornos , cataplaſmas , emollientes &c ; e outra lynfatica , lenta , e pouco doloroſa , que ſe obſerva nos doentes cacheticos , e de hum temperamento flegmatico , á qual competem remedios mais activos , ſejaõ eſtes reſolutivos , ou ſuppurantes ; convem a dieta mais larga , e algumas vezes he neceſſario a quina. He neſte ultimo caſo , que tem lugar a applicaçaõ da pedra infernal no meio do tumor por eſpaço de huma hora pouco mais
ou

ra irritação, ou da gonorrhœa, daquelle que se forma em consequencia da absorvencia d'hum cavallo. A primeira especie abandonada á natureza, ou sómente coberta d'hum cataplasma se curará de ordinario sem difficuldade (a):

ou

ou menos, como aconselha Plenck, para completar a suppuração, e resolução dos humores V. Plenck de Morb. Ven. p. 69. Sem esta distincção, e variação de methodos não podem os Praticos ser bem succedidos no tratamento desta molestia. Pode ver-se a este respeito. Sved. L. C. pag. 194, e segg.

A outra questão que costuma ventilar-se, e que devemos tambem decidir, vem a ser, se o uso do mercurio deve continuar, depois que tomamos a indicação de madurar? Hunter está pela affirmativa, ainda que requer alguma diminuição na sua dose. Porém nós dizemos, que só elle pode ter lugar no caso da inflammação não ser muito activa, como já antes notamos.

(a) Por esta facilidade com que se desvanecem os buboens sympaticos espontaneamente

ou quando se não julgue a proposito esperar, que o abcesso se abra por si mesmo, bastará o golpe d'huma lanceta na parte mais declive do tumor, para dar sahida á materia. Porém na segunda especie, quando o tumor he largo, doloroso, e a maturação mui vagarosa, se nos contentarmos com a incisão do bisturi, far-se-ha calosa a ulcera, e cicatrizará com muita mais difficuldade, do que se for aberto com o cauterio. Tratei ha alguns annos hum enfermo, attacado de buboens em ambas as virilhas,

te, sem algum soccorro da arte, he que muitos charlataens são accreditados, e os seus remedios, aláis perigosos, e prejudiciaes as mais das vezes. Persuade-se o credulo, e liviano vulgo, que estas curas praticadas pela natureza são devidas a certas applicações incautas, que aquelles lhe fizerao, discorrendo pelo seu modo ordinario, *Post hoc, ergo propter hoc*. Succedeo depois disto, logo foi esta a causa. Pelo contrario vem os sabios Professores a ser

infa-

lhas , os quaes suppuraraõ quasi ao mesmo tempo : hum foi aberto com o cauterio , e levou a fechar apenas ameta-de do tempo , que veio a ser necessario para o outro , que se havia aberto pelo bistori. O mesmo observei depois em dous casos semelhantes , que me occorreraõ ; donde colligimos , que o primeiro methodo he preferivel ao segundo. Todavia , o que mais posteriormente me fez conhecer a experiencia , he que a abertura espontanea de qual-quer bubaõ , ainda mesmo daquelle , que vem em consequencia de algum cancro venereo , com tanto que a sua maturação seja breve , e o doente de humma boa compleição , he o caminho mais
pro-

infamados muitas vezes por não curarem com a mesma facilidade , aquelles de que se encargaõ , sendo estes idiopathicos , e por isso muito mais rebeldes.

proprio, e seguro (a), para que a chaga cicatrize com a maior brevidade (b).

§. IV.

Da Fymose, e Parafymose.

A Fymose he huma contracção, e intumescencia do prepucio, que o impede de recuar atraz, para descobrir a glande. Quando este symptoma acompanha a Gonorrhœa (c) he sempre hum ef-

(a) Segue Svediaur esta mesma doutrina, pag. 198.

(b) Algumas vezes succede, que a chaga dos buboens se faz calosa, e se conserva por muito tempo aberta, lançando hum ichor, ou foro de máo caracter; em cujas circumstancias, reprovando Svediaur o uso do mercurio, como estimulante, aconselha a quina, a dieta restaurante, ares de campo, &c. V. pag. 203. Nisbet he do mesmo sentimento, e além disso louva o uso do opio. pag. 220. segg.

(c) As causas mais ordinarias da Fymose

effeito da inflammação (*a*), o qual sendo tractado convenientemente, poucas vezes precisará da incisão, que tão recommendada tem sido neste caso (*b*). As
fan-

se são a gonorrhœa bastarda, ou da glande, as escoriações, e chagas da superficie interna do perpucio, e os cavalloos.

(*a*) Ha outra especie de Fymose não inflammatoria, que vem a ser a chamada crystalina, ou edematosa, a qual consiste n'hum intumescencia lympatica do prepucio. He menos perigosa, e requer o uso topico da agua vegeto-mineral mais carregada, ou agua de cal branda com algum sal ammoniaco, ou sublimado corrosivo: e internamente alguns purgantes.

(*b*) Todos os Praticos modernos mandão evitar quanto for possivel estas operações, convencidos pela experiencia, de que as mais daquellas vezes, em que os antigos as recommendavaõ, são ellas escusadas, e se tem curado os doentes perfeitamente sem algum funesto acontecimento. Comtudo algumas vezes

langrias locais feitas por meio de sangrefugas, são geralmente uteis. Tomar-

se-

zes he indispensavel ; v. gr. quando se manifesta algumas manchas lividas, e gangrenofas (em cujo caso devemos ao mesmo tempo recorrer ao uso da quina), ou houverem indicios de hum chaga cancroza, e de máo caracter, que o prepucio nos occulta, e prohibe de fazer as devidas applicações, &c. Sobre o methodo de praticar esta operação, que consiste em abrir, ou cortar o prepucio, segundo a direcção, e comprimento do membro, ou glande, até onde seja necessario para patentear a molestia que se nos esconde, e que desejamos tratar methodicamente, tem os Praticos tambem variado. Deixaremos de mencionar todos os modos que tem sido propostos, e aconselhados pelos differentes AA., expondo unicamente o de que fazemos uso, como mais efficaç, ao mesmo tempo que he o mais simples, e menos molesto. Consiste pois em segurar com humá mão o prepucio distendendo-o quanto for possivel, e com a outra introduzir por entre elle, e a glande hum

bif-

se-ha cuidado , em que estas não saiaõ
do lugar que devem picar , para que ,
se

bistori virado de lado , ou chato , até áquelle
fitio que debemos abrir: entaõ voltando obistori,
se faz penetrar a sua ponta para a parte externa,
e puxando-o para nós , viremos a cortar todo o
intervallo , que daqui vai até á sua extremida-
de. A ponta do bistori , no tempo da sua
introducção deve ir coberta com hum botaõ de
cera , a qual facilmente cede , e cahe fora na
ocasiaõ que o voltamos para fazer a incisaõ.
Eu prefiro este modo de operar até ao mes-
mo , que pouco ha propoz o celebre Bell , o
qual usa de hum bistori occulto na escava-
ção de hum conductor , que concorre para
conservar a pelle do prepucio com a neces-
saria extensaõ , no tempo que se deve cor-
tar. Quando as chagas , a gangrena , &c. ,
nos não determinão o lugar da incisaõ , e po-
de ficar á nossa escolha , he este outro pon-
to de disputa entre os Praticos. Astruc , e
outros muitos querem que esta incisaõ se fa-
ça a hum , ou ambos os lados para fugir á
hemorrhagia , que deve acontecer fazendo-
se

se estiverem impregnadas com algum virus , não occasionem cavallos , ou gallico

se na parte superior, e media do prepucio , onde correm os troncos dos vasos que nutrem esta parte. Porem o grande Petit , e outros mais , guiados pela experiencia não receão semelhantes fluxos de sangue , que com bem pouco se suspendem , e determinão a operação neste sitio , reconhecendo as grandes vantagens , que a acompanhaõ. Ved. Mr. Petit , *Trat. des Malad. Chir.* Tom. 2. pag. 439. fegg.

Quando por effeito das chagas succede que o prepucio fica unido á glande , depois que aquellas cicatrizaõ , estamos nós em a necessidade de praticar ainda outra operação , por meio da qual separemos estas duas partes. Por brevidade deixo de expor o seu methodo , o qual poderaõ os Leitores achar em varias Obras , particularmente no mencionado Petit. *ibid.* Para comtudo acautelarmos , que isto venha acontecer , quando temos de tractar semelhantes chagas , e queremos despendar-nos da operação da Fymose , recommendaremos

aos

lico confirmado (a). Será conveniente, que se limpe, e banhe a miudo a membrana interna, e inflammada do prepucio, feringando entre ella, e a glande algum leite, diluido com agua, ou agua vegeto-mineral de Mr. Goulard (b).

G

A

aos doentes, que fação todos os dias escorregar, ou mover a pelle do prepucio sobre a glande a fim de destruir alguns pontos de adherencia, que principiem a formar-se. Pela mesma razão he que igualmente convem introduzir alguns fios entre o prepucio, e a glande, no lugar das escoriaçoens, ou chagas.

(a) He por este motivo que Nisbet rejeita as sangrias locaes, que outros não deixaõ de approvar. Estas não bastaraõ, se a inflammação for muito grande, em cujo caso devemos principiar pela sangria do braço.

(b) Esta agua vegeto-mineral, simples, ou feita em agua de flor de sabugueiro, como aconselha VanSwieten, he o remedio mais proprio para as Fymoses não gallicas, as quaes são mui pouco perigosas, e facilmente cedem.

A dissolução do opio tambem tem lugar para acalmar a irritação (a). As appli-

(a) Svediaur insiste nas injeções, e quer que se introduzaõ alguns fios finos com hum estilete, ou sonda entre o prepucio, e glan-de; o que será particularmente necessario se alli houver alguma chaga. As injeções, que elle aconselha, são as feitas da dissolução do mercurio em acido nitroso (agua forte), e muito diluido em agua (pode ser de cevada), ou de agua de cal (branda) com a justa quantidade de sublimado corrosivo (v. gr. hum até quatro grãos a huma libra), ou de cala-molanos (mercurio doce). Julga tambem conveniente a dissolução mercurial de Plenck, feita com a gomma Arabia, a qual eu anteporei sempre, em quanto houver inflammação grande, em cujo caso recommenda o mesmo Svediaur a cataplasma de micapanis, com humas gotas de extracto de saturno para cobrir a cabeça do membro. Hunter, e Nisbet, que já mais se esquecem do augmento de irritabilidade neste genero de molestias, recommendaõ muito, que ás cataplasmas emollientes, e seringatorios se ajunte sempre alguma dissolução de opio.

applicações quentes tem a propriedade de attrahir á parte huma maior copia de humores , e por este modo augmentar a enfermidade (*a*). Porém póde tirar-se grande vantagem dos panos embebidos em agua vegeto-mineral , applicados sobre o membro , e renovados amiudo (*b*).

G 2

Na

(*a*) Tanto as applicações quentes , como as frias são ordinariamente prejudiciaes , nas grandes inflamações , pela razão de que humas , e outras estimulaõ. Entretanto as tepidas , e que igualem o calor da parte , são as que devem convir.

(*b*) Quando esta molestia he muito inflammatoria , e dolorosa , he necessario obrigar os doentes a ficar de cama , e sujeitar-se a huma dieta mui tenue , e de vegetaes. Celso requer tambem , que o membro se conserve levantado , e ligado para o ventre , o que he seguido por muitos. L. C. Cap. 18. §. 2. Disputaõ alguns Praticos ainda , se em attenção ao virus , que acompanha esta molestia ,
quan-

Na Parafymose está o prepucio tão apertado por de traz da glande, que se não póde trazer adiante. Resulta daqui huma constrictão, que se a inflamação for consideravel póde terminar
por

quando ella vem em consequencia de symptomas gallicos, se deve fazer uso do mercurio internamente, prezente a inflammação. A affirmativa, ainda que seguida por alguns, não he a mais segura, e prudente. O mercurio, como estimulante, deve ser suspeito em todas as inflammaçoens. No em tanto lançaremos mão dos antiflogísticos, e adoçantes, como são as emulsoens, soros de leite, nitro, &c.

Depois de passada a inflammação, ou estando esta muito diminuida terá lugar o uso do mercurio internamente, assim como alguns brandos purgantes, cujo effeito deve supprir-se até este tempo com os cristeis emollientes.

Tem aquelle mineral o principal lugar na cura daquella fymose scirrhusa, que resta
algu-

por gangrena. As applicações frias são uteis nesta molestia, assim como na fymose. O volume da Glande pôde ser diminuido por meio de algumas brandas, e repetidas compressões, que fação evacuar as suas cellulas caverrosas (a). Depois do que, pegando no prepucio com os dedos, se puxa com força para cima da glande, e se remedêão assim

algumas vezes depois da inflammatoria, e que he mui rebelde, segundo o genio desta especie de tumores. Deve-se, neste caso, além da cura geral de gallico, tentar os resolutivos mais fortes, a cicuta etc. Se não ceder a estes remedios, devemos recorrer ao uso das caldas, das quaes o celebre de la Peyronie vio maravilhosos effeitos em varias indurações dos corpos cavernosos do membro viril. V. Memoir. de l'Academie R. de Chir. de Par, T. 1., e da ediç. em 12. T. 2. pag. 328. Por ultimo extremo recorreremos á circumcisaõ.

(a) Este mesmo effeito se pode conseguir algumas vezes com a applicação de pannos, molhados em agua fria, ou nevada.

sim alguns casos, que aliás não poderia escusar a operação (a). He este metho-

(a) O tratamento da parafymose pelo que pertence aos remedios geraes, e topicos, deve ser o mesmo que propozemos para a fymose. Se porém este não aproveita, e os symptomas são violentos, e ameaça a gangrena da Glande, faz-se indispensavel a operação, a qual consiste em cortar com hum bisturi, n'hum, ou mais partes aquelle anel, ou collar da pelle do prepucio, que cinge a corôa da Glande, e embaraça a livre passagem dos fluidos, que nutrem esta parte. Devemos comtudo advertir, que o que faz o estrangulamento não são as rugas circulares, que se patentêam mais levantadas; porém certos aneis mais interiores (de ordinario he hum) que devidem o collar nas ditas rugas, e ficam occultos debaixo da sua intumescencia. São pois estes aneis interiores, os que devem ser cortados, e o Cirurgiaão o deve fazer com o menor damno possivel a respeito do resto, que cede com muita facilidade, depois de cortados.

thodo algum tanto penoso , mas de toda a sorte vem a ser preferivel ao instrumento cortante.

§. V.

Dos Cancros Venereos (a), chamados vulgarmente cavallos. (b)

OS cancros venereos devem considerar-se quasi sempre , como meras af-

dos aquelles. A mesma cautela he necessaria para que o bisturi não passe a offender a membrana chamada nervosa dos corpos cavernosos. Algumas vezes humas leves esscarificações, dando sahida a algum humor estagnado facilita a redução do prepucio, sem ser preciso recorrer á principal operação.

(a) Foi-lhes applicado este nome , pela semelhança , que estas chagas tem com as legítimas chagas cancroas , porque não só corroem successivamente as partes adjacentes , mas até manifestão labios calosos , &c.

(b) Costumão muitos Praticos reputar lo-

fecçoens locaes , e pela maior parte não provem de virus gallico , que fosse primeiro introduzido na massa do sangue , e depois lançado para fóra pela acção da vida , como imagináraõ muitos ; mas
saõ

go por gallicas todas as chagas , que se lhe apresentaõ nas partes genitales , o que he hum gravissimo erro ; porque estas partes , tanto não tem motivos para ser isentas das ulcerações de outra qualquer natureza , que antes pela sua estrutura , e função devem , mais do que nenhuma , padecer , e ser sujeitas a este genero de enfermidades. Celso , que viveo muitos seculos antes da descoberta do gallico , faz menção dellas , assim como outros muitos antigos. V. Cels. Liv. 6. Cap. 18. §. 2. Finalmente para evitarmos aos Leitores menos instruidos esta equivocação , a qual pode tambem acontecer arespeito daquellas chagas , que nascem em outra qualquer parte do corpo , apontaremos os finaes ordinarios com que os cavalloos , e todas as mais chagas venereas se distinguem das que o não são.

Saõ

saõ hum puro effeito da inflammação, e ulceração, que produzirão as particulas virulentas, applicadas á superficie membranosa da glande, e do prepucio

Saõ as primeiras algum tanto cavas, e profundas, de ordinario redondas, e de labios callosos: cobrem-se com huma costura branca lardacea, ou como de toucinho: não são demasiadamente sensiveis, principalmente as secundarias; e a cor da pelle que as rodêa he de hum vermelho intenso. Macbride vendo que as chagas scorbuticas erão as que mais se confundiaõ com as gallicas, pela sua má indole, e rebeldia, e porque muitos praticos peccaõ igualmente em imaginar gallicas todas as chagas, que não cedem ao tratamento ordinario, trabalhou por nos dar as differenças destas duas especies de chagas, principalmente quando ellas são na bôca, ou fauces. Vej. a sua Introd. ad Theor. et Prax. Med. T. 2. pag. 400.

Ainda tenho de fazer neste lugar humma advertencia, e he, que as mesmas chagas, que foraõ venereas, deixaõ ás vezes de o
fer

cio (a). He assim que os tenho visto muitas vezes succeder á fymose, e por isso

fer depois da applicação do mercurio: outras vezes vem ellas em consequencia do effeito deste mineral, especialmente ás fauces, e ás gengivas. Todas estas, assim como quaesquer outras, que não sejaõ gallicas, se conhecem, não só porque não tem aquelles caracteres das chagas gallicas, que acima apontamos, mas porque nascem, ou empeioraõ com o uso do mercurio. V. Sved. L. C. pag. 142. segg.

(a) Todas as partes do nosso corpo são capazes de padecer cancos venereos, porém as mais idoneas, e que são atacadas com maior frequencia, são as que estão despidas de grossa epiderme, assim como a glande, a superficie interna do prepucio, dos grandes labios da vulva, as nnytas, a urethra, os beiços, a bôca, as papillas dos peitos, o intestino recto, etc. Outra razão ha para que as referidas partes sejaõ mais vezes accommettidas desta molestia, e he, o estarem mais expostas á applicação externa do virus. He necessaria toda a attenção para não confundir

so só destes tratarei na presente Obra (a).

Fundão-se as objecções, que se tem feito contra o tratamento dos cancos venereos por meio das applicações locais, em que sendo a chaga curada desta maneira, he o virus recolhido para o interior, e o doente fica exposto ao perigo do mal venereo (b). Isto he possível.

os cavallos, que nascem na fossa navicular, ou principio da urethra com a gonorrhea. Devem lembrar-se os Praticos, de que tendo os cavallos huma indole muito mais corrosiva, e depascente, não dão a grande copia de materia, que a gonorrhea faz evacuar.

(a) Os AA. chamaõ *Primitivos* a estes cavallos para os distinguirem dos *Secundarios*, que são os que vem em consequencia do virus geral, e que acontecem algumas, ainda que mais raras vezes. Astruc, e outros dividem ainda os cavallos em benignos, e malignos, por causa da sua qualidade mais, ou menos corrosiva, e deleteria.

(b) O Doutor Fordyce he o mais acerrimo defensor desta opiniaõ.

sível , e eu mesmo o tenho visto acontecer algumas vezes , quando os cavallos , sendo mui largos , produziaõ ao mesmo tempo huma abundante suppuraçaõ , e deste modo offereciaõ á materia huma grande superficie para ser absorvida , e levada á torrente dos humores. Se huma tal chaga he defeccada por meio do unguento mercurial , ou outra substancia estimulante , e adstringente , vem a infecçaõ geral a ser quasi infallivel. Porém quem duvida , de que será viciosa a cura , todas as vezes que se não tomarem as precauçoens necessarias para acautelar esta infecçaõ ?

Pelo contrario , sendo o cancro pequeno , e pouco inflammado , se o tocarmos muitas vezes com a pedra infernal de forte , que a ulcera lance muitas escaras , e appareça em fim limpa , e disposta a cicatrizar , o virus venereo será deste modo destruido , sem que se tema a sua repercussãõ , e aca-

ba-

bará assim em poucos dias huma molestia, que aliás podia durar muitas semanas (a). Para o bom exito deste methodo he preciso tomar cuidado em que

O

(a) A opiniaõ de atalhar esta molestia, consumindo a parte attaccada com a maior brevidade, sobe ao tempo de Ambrosio Paréo, desde entaõ, até os nossos dias, foi quasi geralmente abraçada. São muitos os remedios, e composicoens esscaroticas, e causticas, que os AA. tem proposto, mas destas a pedra infernal tem a preferencia no caso de ter lugar este methodo. Deve ella applicar-se n'huma forma pontaguda, de maneira que a sua acção se limite ao lugar da chaga, sem que offenda os seus arredores. Alguns Praticos propozeraõ a amputação dos cavallos por meio d'hum bistori; mas este methodo, a não ser porque o de cauterio não pode ter lugar, assim como no caso em que Hunter o praticou, não he preferivel ao primeiro. V. Hunter L. C. p. 229. Persuadem-se os propugnadores deste modo de tratar os cavallos, que

o caustico tenha a sufficiente actividade para produzir a escara necessaria; quando não o seu effeito será meramente de estimular, e repercutir o virus, para o interior, donde o devemos desviar (a).

Se

que o virus fica naquella parte demorado por algum tempo, como n'humas especie de incubação; bem á maneira do que se julga succeder a respeito do virus hydrofobico, ou raivoso; e que destruindo nós a parte, ou seja consumindo-a por meio dos causticos, ou separando-a pela incisão, destruimos ao mesmo passo o virus nella retido, e assim se evitaõ todas as suas consequencias.

(a) Advertiremos ainda, que este methodo só terá lugar muito no principio da doença, e quando o enfermo tiver humas constituição pouco sensivel. Neste caso he elle seguido por Hunter, e a maior parte dos Praticos. Quando porem a natureza do doente for muito irritavel, ou a molestia se houver prolongado, costuma então a applicação do

Se porém o cancro venereo he muito extenso , e tem hum máo aspecto , contentar-nos-hemos com hum tratamento mais brando , e suave , como he o de fios seccos , e lavatorios , ou banhos frequentes de leite , e agua morna (a) ,
 &c.

do caustico produzir huma perigosa inflamação. Nestas ultimas circumstancias pegaremos antes dos remedios mercuriaes , ou vi-
 triolicos , que logo apontaremos , os quaes sendo proporcionada a sua actividade á sensibilidade da parte (condição que ja mais deve esquecer) , obraõ mais como abstergentes , e mundificativos , do que como escaroticos , ou causticos.

(a) Nisbet lembra-se de ajuntar aos adocantes , e antiflogisticos alguma porção de opio , para melhor apaziguar a irritação das partes , quando esta he em excesso. Hunter , que poucas vezes larga mão do mercurio , serve-se tambem delle nestes casos , combinado com opio , ou com alguma preparação de chumbo , cuja ultima combinação foi muito inculcada , e recommendada ja pelo Illustre

&c., esperando a completa, e perfeita cura das preparações mercuriaes, que devemos applicar internamente; porque neste estado pode a inflamação, que o caustico excita, ser acompanhada de grave perigo.

O uso commum de tratar estas chagas com topicos mercuriaes estriba-se naquelles mesmos principios, que refutamos, tratando dos seringatorios. O unguento Napolitano (de mercurio) á excepção do que deve á sua qualidade estimulante, não possui neste caso outras propriedades mais, do que as que são proprias de qualquer substancia unctuosa: e o precipitado vermelho obra-
rá tão sómente como obra a pedra Li-

pis

tre Annotador do nosso Madeira, como se pode ver no L. C. pag. 46., e 54. Se a inflamação for grande, deve-se além disso recorrer á sangria.

pis , ou outro semelhante escarotico (a). Além de que , se a chaga for larga , e o doente de huma compleição irritavel , e scorbutica , qualquer pequena applicação do dito precipitado póde ser absorvida , e vir logo á bôca (b). Isto se tem observado algu-

H mas

(a) A pezar destas reflexoens , o methodo de tratar topicamente esta enfermidade , seguido pelos maiores Praticos dos nossos dias , he composto pela maior parte dos remedios mercuriaes. Hunter diz expressamente , fallando da cura externa dos cancos , que o mercurio he o remedio especifico de os curar , assim como o he de qualquer outra enfermidade verdadeiramente venerea (p. 230.). Esta mesma doutrina foi proposta , e seguida pelo referido Illustrador de Madeira , o qual recommenda , que a todos os remedios topicos se ajunte alguma preparação mercurial. V. L. C. pag. 53. fegg.

(b) Isto não obstante , he o precipitado vermelho o remedio escarotico , que está
mais

mas vezes até nas chagas não gallicas
das

mais em voga, e de que se tem feito maior uso, depois que o celebre João de Vigo o descobriu, e recommendou. He verdade, que elle não deve ter lugar nas compleiçoens irritaveis, e scorbuticas, porém o mesmo devemos dizer de outro qualquer caustico, e com mais razão ainda da pedra infernal, por causa da sua maior actividade. Svediaur nas circumstancias de se precisar de escarotico, quero dizer, em quanto a chaga se conserva com a costra atoucinhada, aconselha de ordinario o uso do dito precipitado em pó, e parece antepô-lo geralmente á pedra infernal. Depois da chaga limpa, e mundificada passa elle aos mercuriaes mais brandos, assim como, o unguento mercurial, os calamolanos em pó, ou dissolvidos em agua de cal; e em algumas circumstancias ao sublimado corrosivo na mesma agua de cal, ou á dissolução do mercurio em agua forte, convenientemente diluido. Em alguns casos mais rebeldes assevera, que as fumigaçoens costumão muitas vezes produzir maravilhosos efeitos.

das pernas , sendo pulverizadas amiu-

H 2 do

feitos (L. C. p. 157. seg.). O Doutor Saunders , Medico de Londres , dá a preferencia aos calamolanos , applicados em forma de unguento , dizendo , que esta formula vem a ser menos irritante , ao mesmo tempo que he a mais efficaz , que achara na sua pratica. Propoem o Doutor Cockburn outro unguento , feito de mercurio purificado , e tarebentina ; exagera muito os effeitos deste unguento , e recommenda aos praticos , que nada decidaõ a seu respeito , antes que pela sua observação o hajaõ experimentado. O precipitado vermelho , misturado com o unguento basilição he a formula mais recommendada por Astruc , e Plenck , o qual lhe dá o nome de *Balsamo mercurial*. Não duvidamos de que estes unguentos possaõ ter lugar muitas vezes , quando a inflammação , e acrimonia do virus não for mui activa ; porém sen pre advertimos , que no tocante a oleosos , e formas unguentorias deve haver grande cautela , ao menos , pelo que eu tenho observado. Pela mesma razão he que Hunter , em lugar de

de unguento se servia algumas vezes do mercurio, extinto em conserva de rozas (L. C. p. 230.). Só no caso de não aproveitarem os remedios mercuriaes he que Svediaur manda passar aos meros adstringentes, v. gr. a quina, os vitriolos verde, ou azul, o latao em pó, de que elle tinha observado muito bons effeitos em alguns casos desesperados, &c.

Se porem os cancos venereos resistem a todo este curativo, e ao todo se tem já feito as applicaçoens mercuriaes mais conducentes para effeito de destruir a infecção geral, suppondo que as chagas tem perdido a natureza gallica, e se conservaõ só por causa do abatimento, e falta de energia da constituição, neste caso, manda o dito Auctor largar mão dos remedios precedentes, e recorrer aos corroborantes internos, e externos, como são a quina, a dieta restaurativa, o bom vinho, o ar de campo, os banhos do mar, &c. cuja doutrina he seguida pelos mais modernos. Quando os cavallos, ou chagas gallicas tem outro assento, que não he o das partes genitales, requerem os mesmos remedios expostos, combinados, e variados, segundo o estado dellas, e partes que occupaõ.

do com esta preparação (a).

Entre outros argumentos, que se haõ allegado contra o tratamento dos cavallos pelas applicaçõens topicas, tem lembrado, que o estado da chaga nos devia servir de guia, e como de compasso para julgarmos dos bons effeitos do mercurio, dado interiormente. Deste modo discorrem todos aquelles que só reputaõ os cancrios venereos por symptomas da infecção geral. Elles se limitaõ ao uso dos fios seccos, e quando vem adiantar-se a cicatriz, concluem, que o virus está destruido. He plausivel esta doutrina á primeira vista, porém as reflexões seguintes mostrarão, segundo me parece, que he muito mal fundada.

I.^o

(a) Vesalio fez na cura de todas as chagas hum grande uso do precipitado vermelho, e esta pratica he hoje quasi geralmente abraçada, nos casos em que este remedio he indicado. V. Trat. das chagas das pernas de Mr. Vnderwood, e outros.

1.º Sendo o cancro venereo originariamente hum vicio, e affecção local, segue-se, que quanto mais depressa se destruir o virus nesta parte, tanto mais seguramente se evita a infecção. 2.º He muito de temer esta infecção, todas as vezes que se deixaõ suppurar os cavallos por espaço de muitas semanas. 3.º Esta cura espontanea do cancro vem a ser algumas vezes preludio d'hum bubaõ: e eis-aqui o que eu vi acontecer a hum pequeno cancro da glande, que por espaço de três semanas não foi lavado senaõ com leite, e agua quente, não obstante estar o enfermo no uso do mercurio. No fim deste tempo se estinguio a ulcera, e quando o doente se julgava curado, lhe sobreveio hum bubaõ á virilha, o qual veio á suppuração. Se o cancro fosse cauterisado do modo que eu prescrevi, a absorvencia, e suas consequencias haveriaõ sido provavelmente

mente atalhadas , em quanto por outro lado a applicação do mercurio acau-
telava a infecção (a).

§. VI.

(a) Prova isto a necessidade que ha de tratar os cancos venereos com remedios topicos efficazes , que mundifiquem a chaga , e promovaõ a sua cicatrização com a maior brevidade , ainda no caso de se supper já o todo inficionado , e que por este motivo se fação as applicaçoes geraes do mercurio. Sobre o modo de fazer estas applicaçoes , como elle deve ser variado , segundo a natureza dos doentes , e outras circumstancias , que seria extenso apontar , commettemos isto á eleição , e escolha dos Profellores , advertindo-lhes porém , que o methodo das unturas he o que em geral mais approvamos , e achamos mais certo , e seguro. A respeito da quantidade do mercurio , que deve ser applicada para a total destruição do virus absorvido , dizemos depois de Hunter , que deve ser proporcionada a largura , e grandeza do cancro , ou cancos , e ao espaço de tempo ,
que

§. VI.

Das Obstrucções da Urethra.

AS carnosidades , ou excrescencias fungosas eraõ consideradas ainda ha bem pouco tempo , como a causa mais ordinaria das obstrucções da urethra. Desta opiniaõ foi o celebre Daran , o qual affirmou com toda a sifudeza , que por meio da sua velinha podia determinar com a maior exactidaõ a natureza , figura , e situaçaõ das carnosidades até o ponto de declarar , se estas eraõ redondas , ou ovaes , e se as suas margens eraõ lisas , fungosas , ou calosas (a). Por duas vezes tenho eu

que for necessario para os curar. Porque he certo , que a quantidade da materia absorvida ha de ser em proporçaõ destas duas circunstancias.

(a) A Obra de Daran , intitulada *Observations Chirurgicales sur les maladies de l' ure-*

achado huma pequena excrescencia ver-
ru-

thre, appareceo pela primeira vez em Avinhão no anno de 1743. Nella exalta o A. muito a virtude das suas velinhas, cuja composição conservou em segredo. Todavia alguns Cirurgioens se lisongearão de a ter descoberto, e he assim que estes a suppoem: R.^e de azeite huma libra, de vinho tinto meia libra, hum pombinho vivo, e com penas, ou em seu lugar hum frango. Metta-se tudo em hum vaso novo de barro, e faça-se ferver até que se consuma o vinho; separe-se então a ave de q̃ se fêrvira, e com o resto se derreta de cera amarella, e pez de Borgonha de cada hum quatro onças; de espermacette duas onças, e de emplasto diabolano huma onça. Depois disto se ajunta de poz de folas de çapatos velhos, queimados, desde duas oitavas até duas onças; segundo se quizerem mais ou menos corrosivas as velinhas. Deste unguento, segundo elles dizem, he que Daran fazia as suas velinhas descoagulantes, ou suppurativas (fondentes);

fen-

rugosa na embocadura da urethra, e destes
exem-

sendo as chamadas adoçantes do mesmo, feitas de est'outro modo: R.^e de cera virgem oito onças, de espermacette tres onças, de unguento rosado duas onças, de unguento branco, ou de alvaiade huma onça: derreta-se tudo junto, accrescentando de oleo de amendoas o que bastar, se o emplasto se julgar muito duro. Ved. Fabre Tr. des malad. vener. pag. 116. La Faye Princip. de Chirurg. pag. 189. &c. He facil de ver, que aquella primeira composição, além de informe, e absurda, he hum desproposito, que deve ser inteiramente desterrado da Cirurgia racional. Que mais pode fazer a carne de hum pombo, que não faça a de outro qualquer animal, ou a sua gordura? Os poz da sola de çapato não incluem maior virtude, que qualquer outro absorvente. O mesmo emplasto Diabotano pela sua extensa, e accumulativa composição tem sido desprezado, e proscripto nos nossos dias. Os que ainda hoje abraçam a Doutrina, e principios de Darran sobre o modo de obrar das velinhas, podem

dem ver algumas outras composições da mesma natureza na referida Obra de Fabre.

Warner, celebre Cirurgião Inglez nas suas observações de Cirurgia, obs. 28. expõem a formula de que compunha as suas velinhas, e vem a ser assim. R. e de antigo diachilaõ huma onça, de emplasto de mucilagens duas oitavas, de precipitado branco huma oitava. M. Em lugar do precipitado branco mettia elle algumas vezes oitava e meia, ou duas oitavas de calamolanos, ou precipitado vermelho. Diz elle, que esta composição lhe havia curado hum grande numero de molestias daquella classe de que tratamos. Warner a havia aprendido certamente da Obra de Sharp (Enquiry into the present state of Surgery), na qual se vê recommendada huma semelhante formula. A addição de alguma das preparações mercuriaes he igualmente usada, e aconselhada por este ultimo A.

Os AA. mais modernos, em lugar de preparações mercuriaes, que tem deixado, servem-se mais depressa das de chumbo. Cana-

nada e meia de azeite , huma libra de cera , e libra e meia de Lytargyro , unidos , e fervidos juntamente a hum fogo brando por tempo de seis horas , constituem a formula , recômandada por Hunter (L. C. pag. 137.) para a formação das velinhas , a qual vem a ser mui pouco differente da de Goulard , bem conhecida hoje dos praticos , que della fazem grande uso.

A simplicidade destas ultimas composições , que os sabios modernos tem geralmente adoptado , allás confirma a opiniaô do nosso A. de que devemos esperar tudo da acção mecanica , e compressiva das velinhas , e que a doutrina de Daran , Sharp , Warner , e outros que requerem nellas huma virtude suppurativa , he illusoria. Tambem nos convence desta verdade o uso frequente das cordas de rabeca , das velinhas de goma elastica &c. e os bons effeitos que delle se seguem.

exemplos haõ encontrado alguns outros Praticos (a). Todavia temos alguns Anatomicos celebres , os quaes asseveraõ , que as carnosidades saõ huns meros entes de razaõ. Morgagni (no seu Tratado de *Sedibus , & causis morborum*.. L. 3. Epist. 42.), declara naõ ter visto mais do que hum exemplo de carnosidades entre o grande numero de urethras , que havia dissecado (b). Devemos crer portanto , que este accidente he mui raro ; e quando ouvirmos a algumas pessoas gloriarse de haver muitas vezes curado esta molestia , faremos logo conceito de que saõ ,

(a) Sharp certifica ter encontrado alguns casos de carnosidades nas disseccoens , que praticou , ainda que naõ nega serem estes mui raros. L. C. Dous foraõ os que occorreraõ a Hunter (L. C. pag. 167.) &c.

(b) Tendo Petit aberto a urethra de doze doentes , que padeciaõ obstrucçoens neste canal , em nenhum encontrou apparencia de carnosidade. V. Anatom. Chirurg. de Palfin. Vol. 1. pag. 189.

faõ, ou muito ignorantes, e credulas, ou embulleiras.

Em lugar de carnosidades, póde muito bem a obstrucção ser occasionada pela intumescencia da substancia esponjosa da urethra, depois que a gonorrhœa enfraqueceo a sua membrana interior.

Suppoem Goulard (*Trait. des malad. de L'urethr.*) que esta especie de obstrucção he a mais commun, e frequente de todas (a); e se taõ poucas vezes haõ della feito menção os AA. que se occupaõ das disseccoens dos cadaveres, he isto, segundo o seu parecer, porque a morte produz em todo o tecido cellular hum tal abatimento, e depressão, que extingue todo o vestigio desta fórte de intumescencia. Morgagni

(a) Esta opiniaõ segundo o testemunho de Garangeot, havia sido estabelecida por Arnaud, e Petit, *Cel. Cirurgioens Francezes*: V. *Gareng. Chirurg.* pag. 317.

gagni não encontrou cousa alguma , que o fizesse suspeitar semelhante causa ; comtudo não duvidamos , poder ella ter lugar , e que realmente existe algumas vezes , ainda que mui poucas.

Finalmente a causa mais geral desta obstrucção parece ser hum aperto , ou contracção de alguma parte do canal da urethra (a). Não he facil o determinar a origem desta molestia , porém he certo , que ella póde vir em consequencia d'huma inflammação , ou escoriação antecedente. De ordinario he acompanhada de hum distillação , ou corrimento de humor , que provém da irritação , e inflammação de que he atacada a urethra no sitio do aperto , além do qual se encontra mais largo este canal (b). Algumas vezes acontecem

(a) He este o mesmo sentimento de Sharp, e de quasi todos os modernos.

(b) Procede isto da demora da ourina ,
que

cem suppurações, que se abrem pela parte externa: a urethra se rompe entre o lugar da contracção, e o collo da bexiga; derrama-se a urina pelo abcesso, e mantem huma chaga fistulosa, cuja féde ordinaria he no perinéu. Se a doença se despreza, ou he mal tratada, as partes visinhas se inflammão, e suppuraõ; multiplicaõ-se as aberturas fistulosas, communicando todas com o centro da molestia, cuja natureza, e decurso, sendo affás manifestos, nos fazem conceber facilmente os meios da sua cura (a). O objecto prin-

que não podendo passar no ponto do aperto, se accumula entre elle, e a bexiga, e deste modo produz huma dilatação preternatural na urethra.

(a) Eis-aqui, segundo Stoll (Prælect. in divers. morb. chronic. pag. 117.) todas as causas que podem concorrer para as obstrucções da urethra, e de que nos devemos lembrar quando houvermos de tratar esta enfermidade. Con-

principal vem a ser aquelle ponto de
aper-

Constituem a 1.^a os espasmos repetidos de alguma parte da urethra, por effeito da maior irritabilidade, que contrahio no tempo da inflammação da Gonorrhœa; em cujo caso he a ischuria, ou retenção da ourina temporaria, e alternativa. Esta succede ordinariamente, quando se tomão comidas, ou bebidas acres, e espirituosas, que augmentão a acrimonia das ourinas, ou com o exercicio de cavallo, ou outro algum excessso, se irrita, e commove violentamente a parte lesa. Aconselha o A. os seringatorios da mucilagem das pevides de marmelos, os quaes convirão principalmente na occasião do ataque, ou se houver falta do muco, que lubrica a superficie interna da urethra: porém os proprios remedios, que tem poder de curar radicalmente esta molestia são só os tonicos, e corroborantes, como o nosso A. aconselha adiante: a quina, os banhos frios, etc. As velinhas tambem tem lugar. Stoll faz menção neste mesmo lugar da adherencia dos lados da urethra em consequencia da inflammação, e

aperto , vencido o qual , se acautela , e
reme-

falta , ou espessura do mucos , bem como acontece á pleura nos pleurizes , e inflammações desta membrana. A esta especie devem tambem pertencer aquellas trabeculas , ou cordoens , que ficão atravessando a cavidade da urethra depois das chagas deste canal , as quaes sem duvida podem ser origem daquellas adherencias , como notou , e observou Svediaur (L. C. pag. 118.) ; e antes d'elle Sharp.

A 2.^a causa referida por Stoll he a intumescencia das glandulas , que resta depois da Gonorrhœa ; e cujo unico remedio vem a ser a acção mecanica das velinhas , ou de alguma corda de rabeca , bem como nos casos da adherencia , que acabamos de referir.

A 3.^a o incrassamento das membranas da urethra , segundo a idea de Petit , Gaulard , e outros.

A 4.^a a cicatriz , ou corrugamento que esta pode motivar na urethra. Ambas estas causas requerem o uso das velinhas , ou corda.

A 5.^a as ulceras do mesmo canal ; para as quaes recommenda o A. as fomentações ,

remedêa o abscisso do perinéo (a).

He por tanto necessario procurar
com

e feringatorios mercuriaes ; v. gr. de leite mercurial de Plenck , do sublimado corrosivo , etc.

A 6.^a as carunculas , ou carnosidades propriamente taes , ainda que confessa (do mesmo modo que o noílo A.), que estas existem raras vezes. Propoem os mesmos remedios mercuriaes externos , e internos. 7.^a as hemorroidas da urethra. Approva os eccoproticos brandos , e algumas bichas lançadas junto da via posterior. 8.^a As affeçoens da glandula prostatica , sejaõ por effeito de inflammação , maturação , ou scirro. 9.^a A intumescencia , e callosidade dos ductos excretorios da glandula prostatica , das vesiculas seminaes , das glandulas de Cowper , do Verumontano , etc. Conuem nesta , e antecedentes as velinhas solidas , e ocas , etc.

(a) Algumas vezes se acha esta constricção em mais do que hum ponto. Hunter chegou a notar 6 n'humas mesma urethra. Neste caso hiremos nós vencendo hum depois d'outro obstaculo com o uso das velinhas , até que desappareção todos.

com tempo, e por meio das velinhas huma dilatação gradual do canal da urethra. Ao passo que cede a obstrucção corre a ourina mais livremente, e a irritação, e corrimento diminuem. Este he o principio a que se referem todos os effeitos das velinhas bem administradas. A composição destas deve ser tal, que possuão huma sufficiente firmeza para serem introduzidas na urethra, e alli restarem o tempo necessario, sem o receio de se quebrarem; ao mesmo tempo que por outro lado devem conservar huma certa brandura, e flexibilidade, por effeito da qual se franqueem a qassagem, e se accomodem aos diferentes movimentos do corpo. Devem finalmente ser mui lisas, e preparadas de maneira, que não contenhaõ couza alguma irritante (a). Por mais doces, e macias
que

(a) Huma corda de rabeca de grossura proporcionada, se introduz mais facilmente
do

que fejaõ as velinhas , em razaõ de corpos estranhos saõ affás estimulantes , quando se introduzem n'hum parte taõ delicada , como a urethra ; na qual se se demorarem por algum tempo , naõ podem deixar de produzir huma mais abundante secreçaõ de muco. A chamada suppuraçaõ , que vem depois do uõ de certas velinhas , reputadas especificas desta molestia , he o effeito deste mesmo estimulo n'hum grão mais superior ; porque a verdadeira suppuraçaõ suppoem huma exulceraçaõ actual , a qual a inflammacaõ pode com effeito occasionar , se o estimulo da velinha

do que huma velinha , e por isso consegue algumas vezes no principio , o que esta naõ pode obter. Eis-aqui porque os Praticos se naõ devem esquecer della no caso de difficulda-de. Pelo que pertence á composiçaõ das velinhas , pode-se ver a nota primeira deste Capitulo , pag. 120. segg.

linha for violento , e muito tempo continuado.

Fica logo claro , que se as velinhas forem tão estimulantes , que venhão a inflammar , e escoriar a urethra , em lugar de beneficio faraõ hum grave damno. Porém ainda que pareça allás evidente , que neste caso dellas inflammarem , e escoriarem a urethra , deve o seu effeito ser prejudicial; e que só por este modo podem produzir huma suppuraçãõ , a naõ se suppor o apero occasionado por huma ulcera , o que naõ tem lugar : isto naõ obstante , tem sido tão dominante a idéa da virtude suppurativa das velinhas , que o mesmo defunto Sharp , aliás muito instruido , e inteiramente convencido de que esta noção era mal fundada , se deixou arrebatado pela commum preoccupaçãõ , admittindo huma acção combinada em parte de suppuraçãõ , e em parte de dilataçãõ (V. Indagaç. crit. sobre o estado pre-

presente da Cirurgia). Finalmente os Praticos mais modernos, não tendo ainda alcançado, e comprehendido bem a differença que ha entre o muco, e o verdadeiro pús, propendem do mesmo modo para o erro de considerarem todo o augmento, e alteração do primeiro, como hum effeito de purulencia.

No caso de recorrermos ás velinhas, feroão estas escolhidas de huma tal grossura, que possaõ entrar com facilidade, e sem occasionar alguma dor (*a*). A sua extremidade será delgada, e se untará com azeite para que passe mais facilmente; e deve ser lenta, e suave a sua introducção (*b*). Não poucas vezes
tem

(*a*) Sharp adverte, que o obstaculo concede algumas vezes a passagem a huma velinha mais grossa, quando a havia negado a huma mais delgada; e por isso he que deveremos no caso de difficuldade tentallas de differentes grossuras. L. C.

(*b*) Estará o doente de pé, afastando hum
pou-

tem acontecido , que hum velinha algum tanto grossa , sendo puxada por hu-

pouco as suas pernas , ou na posição , em que se costuma fazer a operação da pedra , isto he , deitado de costas com as pernas igualmente abertas , e dobradas de modo , que os pês fiquem unidos ás nadegas. Logo que toparmos com o embaraço , e que a velinha encontrar resistencia , cessaremos de a puxar com grande força , porque de ordinario dobra (o que deve evitar-se) , e não passa adiante. Se intentarmos adiantalla mais alguma cousa , a puxaremos com muita brandura , torcendo-a ao mesmo tempo entre os dedos. O final de que ella penetrou o obstaculo , he o não recuar cousa alguma depois que a largamos da mão. Além disso para favorecer a introdução da velinha , he necessario que o Professor (ou quem fizer esta operação) , pegando com o dedo pollogar , e index na coroa do membro , o estenda de forte , que a urethra , tome hum superficie lisa , e desfaça todas as rugas , que antes disso podia ter.

huma mão rude , e pouco habil , veio a furar , e romper a membrana da urethra. Na Obra do referido Sharp lemos nós , que a compressão de algumas horas contra a parte mais levantada deste canal , motivou a saída da velinha pelo intestino recto , e isto só por effeito da sua dureza (a). A' proporção , que cede ,
e

(a) Não obstante a brandura , e suavidade , sempre recommendada nestes casos , se o embaraço da urethra resistir muito , e o doente , sendo pouco irritavel , poder soffrer hum maior esforço na introdução da velinha , será este posto em pratica gradualmente , tendo sempre diante dos olhos os danos , que pode vir a causar , e ficão ponderados. Deste modo conseguiremos algumas vezes o que por meio da suavidade não foi possível alcançar. Nisbet , e Hunter o aconselhaõ , ainda que este ultimo adverte , que mui poucos sujeitos são capazes de o soportar (L. C. pag. 122.). Seraõ entãõ as velinhas hum tanto mais grossas para sustentarem a maior força , que intentamos imprimir-lhes.

A

e se desvanece a obstrucção deve o volume, ou diametro da velinha ser augment-

A applicação do caustico tambem he recommendada por Hunter nos casos de ser totalmente impossivel a passagem das velinhas; ou seja porque o aperto da urethra he tão grande, que não admite absolutamente a mais delgada candelinha, o que he raro; ou porque o orificio do dito aperto não está em linha recta com a urethra; ou finalmente porque este canal esta inteiramente fechado, o que acontece muitas vezes nas fistulas do perinéo. Antepoem elle este methodo ao da violencia, no caso de ser indispensavel hum dos dous. Serve-se da pedra infernal fixada na ponta de huma vara de prata, a qual faz passar por dentro de hum canudo do mesmo metal até o lugar do embaraço, e alli a conserva por espaço de hum minuto, tempo que julga sufficiente para produzir o effeito desejado. Será bom que o doente urine logo depois, podendo, quando não deve-se fazer uso de algum seringatorio, para lavar, e extrahir aquella porção do caustico, que se dissol-

gmentado gradualmtnte até que o aperto , ou estreiteza seja de todo destruída. A duração do tempo , que a velinha ha de restar na urethra , será regulada pela sensibilidade do enfermo. No principio bastará , que ella se demore por hum quarto , ou meia hora ; depois virá o paciente a soffrella por muitas horas no dia , havendo da nossa parte o cuidado de lhe evitarmos todo o excessão de importunação. Succedendo alguma irritação , he necessario suspender o seu uso , até que esta se desvaneca. Se a constricção se desprezou por muito tempo , ou não foi sufficientemente combatida-

solveo. Offerece-nos a descripção , e estampa destes instrumentos , que elle descobrio , e nos dá hum exemplo do seu bom successo (V. L. C. pag. 126. segg.). Esta idea de applicar escaroticos neste genero de enfermidades he muito antiga , e vem do tempo de Afonso Ferreo , o qual viveo no principio do

batida, e ha' sinaes de algum deposito, far-se-ha logo huma abertura para dar prompta saida á materia. No caso de que esta abertura se haja feito espontaneamente, e communique com a urethra,

do seculo XVI. Manda este A. applicallos na cura das verdadeiras carnosidades. Eu já me servi huma vez deste methodo de Hunter no caso de huma fistula do perinéu, pela qual a maior parte da ourina se extravasava. Rompi pois a cicatriz, que impedia quasi toda a passagem da ourina pela urethra, e com tão bom successo, que excedeo a minha expectação. Notei em fim, que a mais longa demora desta pedra no dito canal, onde ella ficava algumas vezes por cinco, e mais minutos, e até mesmo se gastar, e derreter toda a porção, que se havia introduzido, não produzia irritação de maior, ou inflamação sensivel, não obstante ser o doente de hum temperamento assás irritavel. Desde esta occasião, fiquei com maior confiança neste methodo, o qual então applicara com muito receio.

thra , deve ampliar-se , e recorrer logo ás velinhas para precaver o aperto.

Tenho encontrado alguns casos de constricção da urethra , que erão momentaneos , e devidos unicamente , segundo o que parecia , a hum espasmo , filho da nimia irritabilidade deste canal. Hum tal accidente , bem como a curvatura espasmodica do membro , vence-se ordinariamente com a quina , seringatorios anodynos , e velinhas.

Nada dissemos tocante ao uso interno do mercurio nestas obstrucçoens da urethra , porque estamos convencidos , de que , geralmente fallando , são meras affecçoens locaes. Se porém succeder , que sejaõ complicadas com vicio venereo , he indispensavel a applicação do mercurio.

*Dos corrimentos , ou purgaçoens rebel-
des , que subsistem depois da Gonor-
rhea (a).*

NO Capitulo antecedente notamos ,
que o aperto da urethra era acompa-
nhado de hum corrimento , ou fluxo
de materia , semelhante áquelle que se
observa , quando a prostata padece. He
este sempre hum producto da irritação ,
e se remedêa atalhando a causa local.
Porém ha outra especie de purgação
continua , que parece filha do relaxa-
mento da parte (b). Costumaõ padecel-
la

(a) Os Inglezes chamaõ a este corrimen-
to *Gleet* , e os Francezes *Gonorrhée habi-
tuel* , isto he , Gonorrhœa habitual , cujo no-
me conservaremos , e o qual compete em
geral á purgação , que existe depois de pas-
sados os symptomas inflammatorios da Go-
norrhœa , puramente tal , ou virulenta.

(b) Não faz menção o nosso A. sennaõ da
Gonorrhœa habitual , que provem do relaxa-
men-

la aquelles sujeitos, que haõ soffrido longas ,

mento , como acontece pela maior parte : porrem nós reconhecemos outra especie , que as chagas da urethra produzem , e alimentaõ. Vem estas ordinariamente em consequencia de huma Gonorrhœa violenta , ou mal tratada. O seu assento pode ser mais , ou menos alto , segundo a extensão da urethra ; e pode alem disso occupar o corpo de algumas glandulas , v. gr. de Cowper , da prostata , &c. , ou não passar alem da propria substancia , e tunicas da mesma urethra. Em geral , quanto mais profundas forem as chagas no interior deste canal , mais capazes seraõ de produzir difficuldades de urinar , estreitezas da urethra , e retençoens de urina ; e a sua cura virá igualmente a ser mais difficil , e rebelde. Os symptomas que nos fazem suspeitar huma ulcera , saõ : 1.º alguns filamentos de sangue , juntos com o muco , que corre , principalmente depois que a violencia da inflammacão se apazigou. 2.º Huma purgacão com os verdadeiros caracteres de pús , dissolvendo-se perfeitamente na agua , etc. 3.º A dor fixa n'huma

cer-



gas , e frequentes Gonorrhœas , e em geral não provém, nem he mantida
por

certa parte da urethra , a qual se aviva com o toque de qualquer corpo neste sitio ; com a introducção de huma velinha , ou sonda ; e finalmente com a passagem da urina , ou semen. Se a estes finaes se ajuntão alguns anamnesticos , venho a dizer , que nos consta de haver precedido huma vehemente inflamação ; hum máo methodo de cura ; huma violada introducção da seringa , etc. muito mais certos ficaremos da existencia da chaga:

O methodo de tratar esta deve ser hum pouco differente. He indispensavel a applicação interna do azougue , conforme o que já advertimos no Capitulo da Gonorrhœa ; porque já mais deixará o virus gallico de se communicar ao todo , no caso de ulceração. Pelo que respeita aos remedios topicos , também convem geralmente os mercuriaes. Recommenda Svediaur a injeção do sublimado corrosivo , e lythargyro dissolvidos em vinagre , e diluidos em sufficiente quantidade d'agua. Será proveitosa a agua vegeto-

mine-

por algum vicio venereo. Não poucas vezes procede ella do enfraquecimento , que occasionáraõ os purgantes , ou abuso dos mercuriaes (*a*). As mulheres são mais depressa atacadas desta molestia , se he que os fluxos brancos , que sobrevem depois das Gonorrhœas , não são considerados , como pertencentes a esta especie de corrimento.

Quando não houver suspeita de virus gallico conviráõ os feringatorio adstrin-

mineral de Goulard. Alem dos feringatorios tem lugar as velinhas mais , ou menos irritantes , ou anodynas , e apaziguantes. As de Goulard me parecem proprias.

(*a*) Algumas vezes apparecem estas purgaçoens depois de huma copula , hum exercicio violento , ou algum excessõ , e desordem de comida , havendo cessado de todo o fluxo da precedente gonorrhœa alguns dias , ou semanas antes. Por isso he necessario evitar taes occasioens , e tudo o mais que he capaz de commover , e agitar a circulaçaõ , ou de pro-

adstringentes (a), havendo ao mesmo tempo consideração á faude geral do enfermo. Deve-se fazer uso da quina, das

duzir estímulo, e irritação na parte lesa. A purgação, que volta por causa de hum ajuntamento sem nova infecção, apparece logo depois do acto, e de ordinario sem symptomas graves de inflamação. Sirva isto para nos desenganar em parte da natureza de semelhantes corrimentos, que sem duvida poderão algumas vezes occorrer por effeito de nova Gonorrhea virulenta.

(a) Os modernos aconselhaõ particularmente o feringatorio de Vitriolo branco, e de sal de saturno, ou bollo armenio, diluidos em agua. Eu me sirvo ordinariamente dos dous primeiros, cada hum na dose de hum escropulo até meia oitava, para meia libra d'agua. Pode-se recorrer tambem aos feringatorios de pedra lipis, de pedra medicamentosa da Farmacopêa de Londres, da agua vitriolica azul da mesma, &c. A força de cada hum destes, que todos devem ser diluidos em agua, deve graduar-se, e proporcionar-se á constituição,

das aguas ferreas , dos banhos frios ,
e de outros meios analogos , proprios
pa-

ção , e estado do doente , de maneira que devendo seguir-se sempre á sua applicação algum sentimento de ardor , e adstringencia , que denote a sua acção , não será esta tão grande , que produza huma inflammação , retenção de urinas , ou outro semelhante symptoma. Por este motivo devemos sempre principiar por feringatorios mais brandos , e depois , segundo o seu effeito , augmentar a sua força. Hunter refere o caso de huma destas purgaçoens , curada com a injeccão do extracto de saturno puro. Tal he algumas vezes a inercia , e relaxamento das partes , que soffrem hum tão activo , e forte adstringente. Todavia deste modo será o dito remedio mui poucas vezes applicavel : pode o seu uso ser ampliado , diluindo-o convenientemente em agua. Todos os AA. se lembrão tambem de feringatorios estimulantes , que produzaõ huma viva irritação na parte , e por este modo contraheão os orificios dos seios , e vasos relaxados. Desta classe são todas as prepara-

para corroborar , e fortificar o systema geral. Se o doente não tem propensão al-

çoens mercuriaes , que o nosso A. (no Cap. da Gonorrhea), Hunter , e outros affirmão não possuirem alguma outra virtude antivene-rea , applicadas deste modo. D'entre estas as de que os Praticos fazem mais uso , são os calamolanos , e sublimado corrosivo , e particularmente o ultimo. Segundo a formula de Plenck (Doctr. de Morb. Ven.) a huma libra de agua compete grão e meio deste remedio , mas tem-se achado , que esta quantidade he muito forte para os habitantes do nosso paiz , * e que estes raras vezes soffreraõ acima d'hum grão em cada libra daquelle liquido. Entra tambem nesta classe o uso das velinhas , que alguns AA. recommendaõ , e que com effeito podem ter lugar. Não he d'outra maneira , que hum exercicio de cavallo violento , e mui continuado , tem algumas vezes completa-

* Vede a traducção desta Obra de Plenck , feita pelo Senhor Manoel Joaquim Henriques de Paiva. pag. 211.

alguma para a inflammação, fer-lhe-
haõ mui vantajosas as grandes doses de
balsa-

do curas desta natureza, como observáão
Cullen, e outros.

Parecerá talvez contradictorio, que estes
remedios, e meios irritantes, que ha pouco
dissemos serem capazes de chamar de novo
a purgação, ainda mesmo depois de estar
esta de todo estancada, possaõ suspender o di-
to corrimento, porém não he assim. Verda-
de he, que elles augmentaõ a purgação nas
primeiras applicaçoes, em razão do estimu-
lo, que accrescentaõ, mas pouco depois, quan-
do este estimulo se faz menos sensivel,
pelo habito, e maior vigor que as partes
tem adquirido, vem a cessar a dita purgação.
Todavia os remedios adstringentes devem ter
o primeiro lugar, e só no caso de serem es-
tes baldados, he que passaremos aos estimu-
lantes. Ainda nos resta fazer outra adverten-
cia a respeito dos remedios topicos irritantes,
e he que estes não podem ter lugar naquelas
naturezas, que forem mui fracas, e irri-
taveis, e por isso incapazes de supportar a
sua

balsamo de cupaiva (a). Eu presenciei o caso de huma purgação rebelde, a qual

sua acção sem alguma ruina: donde se vê quam circumspecto deve ser o seu uso.

Os feringatorios de qualquer natureza que sejam, devem-se applicar frios. Serao repetidos tres, quatro, e mais vezes ao dia, e continuados por dez, ou doze dias depois de perada totalmente a purgação, para segurar a cura.

(a) Todos os balsamos podem ter lugar, e são uteis nesta enfermidade, porém mais particularmente o de cupaiva, e a terebentina pela razão de terem maior affinidade com as vias da ourina, de que he huma prova o cheiro terebentinaceo, que estas espalhão depois do uso de algum delles. A dose ordinaria do balsamo de cupaiva he de 30, até 50 gottas, ou de meia oitava. O melhor modo de o tomar he desfazendo-o n'huma gema d'ovo, ou em qualquer xarope apropriado, com huma porção de gomma Arabia. Para fazer este remedio menos desagradavel ao estomago manda Svediaur beber-lhe em cima hum

qual tendo resistido a grande numero de remedios , veio a ser curada por meio de hum vesicatorio lançado sobre o perinéu (a).

Em

hum copo d'agua fria com 20, até 50 gottas de elixir acido de vitriolo.

Hunter nos dá huma nota interessante a respeito do uso dos balsamos , a qual a experiencia nunca desmentio. „ Quando estes (diz „ elle) não houverem curado , ou diminuido a „ enfermidade em cinco , ou seis dias , não temos que esperar da continuação do seu uso , „ a qual será inteiramente frustrada. Pelo contrario se elles produzem algum fructo neste „ espaço de tempo , he necessário continuallos „ por algum mais , ainda depois de cessarem todos os symptomas ; porque aliás acontece frequentemente a reincidencia da molestia „ (V. L. C. p. 102.).

Os remedios adstringentes , que a maior parte dos AA. aconselhaõ , dados internamente , são de mui pouca , ou nenhuma efficacia.

(a) Attesta Bosquillon (Traduç. Franc. dos Elem.de Med.pratic.de Cullen. not.ao §.1777.);

que

Em geral basta o que deixamos
recommendado para curar esta molestia ;
po-

que por varias vezes , depois da asserção do
nosso A. , se tem tentado este vesicatorio sem
alguma utilidade. Pelo contrario lemos na Obra
de Hunter , que elle aproveitara em dous ca-
sos , applicado por este grande Pratico. O
modo de obrar deste remedio vem a ser
produzindo huma irritação n'huma parte dif-
ferente , e algum tanto remota daquella que
padece , por effeito da qual irritação se des-
vanece a primeira , que mantinha a enfermi-
dade. Por huma lei geral da economia
animal sabemos , que as sensações mais
fortes offuscaõ , e suffocaõ as mais leves ; e
que a natureza , acudindo (por assim dizer)
àquella parte , onde existe hum maior senti-
mento , desampara a parte lesa. Parece ser
assim que os espasmos , e contracções vio-
lentas , que são effeito de huma acção
vital muito augmentada , se soltaõ , e des-
vanecem. Porém seja deste , ou de outro
modo que a cousa aconteça , a experien-
cia quotidiana nos convence da sua rea-
lida-

porém algumas vezes continúa o corrimento a pezar de todos os esforços, que se

lidade. Pela mesma razão he que o mesmo Hunter vio desaparecer huma Gonorrhea habitual, depois que á glande do enfermo sobrevierão dous cavallos. Esta doutrina pode igualmente applicar-se ao uso dos purgantes. Não só pela irritação, que produzem no decurso do canal intestinal, podem elles fazer cessar a do canal da urethra, mas por huma dirivação de humores, que affluindo em maior copia ao primeiro, devem estancar a purgação do segundo. A natureza, que se desvela incessantemente sobre a nossa conservação, não pode sustentar por muito tempo duas, ou mais evacuaçoens augmentadas, sem caminhar para a sua ruina; e por isso ella costuma supprimir huma, depois que outra se restabelece, ou augmenta. He todavia necessario, para que nos sirvamos dos purgantes, que o vigor da natureza, e constituição do doente o permittaõ; e que não subsista a molestia por hum puro effeito de debilidade, e fraqueza do systema geral, como succede as mais das

ve-

se hajaõ feito para o suspender (a).

vezes , quando a purgação he muito antiga. Utiliza pela maior parte o methodo dos purgantes continuados , sendo posto em pratica logo depois que cessa a inflammação da Gonorrhœa habitual , conservando nós sempre a mira na constituição , e temperamento do doente , de que já mais nos esqueceremos.

(a) Lembra-se Hunter de que estes teimosos , e refractarios corrimentos possaõ provir algumas vezes de hum vicio escrofuloso , e allega para prova , que os banhos do mar tem sido muito mais efficazes do que outros quaesquer banhos frios ; e que as injeções da mesma agua do mar muitas vezes aproveitáraõ. Porém eu não acho que estas provas sejaõ convincentes. Em todos os casos de langor , em que as forças , e temperamento dos enfermos se podem accommodar ao uso dos banhos do mar , tem estes mostrado a sua maior efficacia , comparados com os de agua doce. Quanto ás injeções da mesma agua , estas se incluem na classe dos remedios estimulantes , que já dissemos serem proficuos. Não he por tanto necessario recorrer á

fa-

faculdade que possuem estes remedios de curar as molestias escrofulosas, para dar a razão dos seus bons effectos. Eu não quero dizer, que a affecção escrofulosa se não complique algumas vezes com estes corrimentos, porém não me posso accommodar a que isto succeda por alguma maior affinidade, ou relação, que tenha com elles. O que nos deve certificar da coexistencia deste virus são os seus symptomas pathonomicos.

He a natureza finalmente a que por tempo extingue algumas vezes estes fluxos pertinazes, que os mais efficazes remedios não podêrão curar. De qualquer qualidade que os remedios sejaõ, fatigaõ a natureza, e a constituem n'huma especie de violencia, principalmente sendo continuados por muito tempo: por este motivo he que ella se não restitue ao estado de perfeito vigor, e satisfação de baixo do seu uso. Eu daqui tiro a razão de semelhantes acontecimentos, os quaes não sô se observaõ nesta molestia, mas em quasi todas as mais. *Aliquid nature dandum.*

Não será fora de proposito, o accrescentar-

tarmos alguma cousa a respeito da Ophtalmia , e Surdeza Venerea , visto que estas enfermidades , particularmente a primeira , são muitas vezes huma consequencia da gonorrhea virulenta.

Ophtalmia Venerea.

OMais grave , e terrivel de todos os symptomas , que a Gonorrhœa produz , he sem contradicção a Ophtalmia , cujo exito he bastantes vezes huma completa cegueira. A repentina , e intempestiva supressão de huma recente , e virulenta Gonorrhœa dá quasi sempre occasião a esta molestia. Em todos os casos de que Svediaur nos dá conta , foi aquella supressão motivada pela incauta , e continuada exposição do enfermo a huma atmosfera mui fria , por onde julga ser esta a sua mais ordinaria causa.

Carlos S. Yves , que foi o primeiro que tratou desta doença , Astruc , e muitos outros imaginaõ , que ella he filha da metasta-
se ,

se, ou transporte da materia virulenta da gonorrhea para os olhos. Porém esta doutrina foi rejeitada por muitos modernos, aos quaes as grandes luzes da Anatomia, que possuem, não tem podido descobrir o caminho por onde esta passagem se possa executar. A circulação geral, e o tecido cellular são os unicos, que podem lembrar; mas porque razão se vai esta materia mais depressa depositar nos olhos, do que em outra alguma parte das que deve correr? Astruc nos satisfaz em parte, dizendo, que todos os que tem padecido esta especie de Ophtalmia, ou erão naturalmente dotados de olhos fracos, e delicados, ou padeciaõ delles por causa de algum attrito, pancada, &c.

Os que não admittem a metástase, recorrem á sympatia, da qual a Fysiologia nos não dá muito mais conhecimento. Comtudo a analogia entre as partes da geração, e os olhos parece ser assás reconhecida, e confirmada pela experiencia. Todos sabem os effeitos que as vistas deleitosas produzem nestas partes. Porém seja como for, o facto he verda-

dadeiro , e isto basta ao Medico Clinico : *Sufficit , ut sciamus illud , quod fit , etiam si quomodo id fiat ignoremus.* Cicer.

Ainda que esta ophtalmia aconteça as mais das vezes por effeito da suppressão da Gonorrhea , tem-se ella algumas vezes experimentado sem ser precedida deste symptoma , mas antes continuando o fluxo gonorrhoeico do modo ordinario , o que muito bem advertio Astruc. Este Auctor , e alguns outros se lembrão tambem de que ella pode provir por occasião dos doentes esfregarem , ou tocarem os olhos com as mãos , depois de com ellas terem espremido , e observado a qualidade da materia gonorrhoeica , sem primeiro as lavarem. He sem duvida , que por este , ou outro semelhante modo se pode comunicar immediatamente aos olhos alguma porção de materia infecta , que por meio do seu estimulo produza a ophtalmia. A possibilidade desta causa he confirmada por casos de pratica. Astruc nos refere o de hum mancebo , que continuando , segundo o seu antigo costume a lavar os olhos com a sua urina de-

depois de contrahida huma Gonorrhœa virulenta, veio [a padecer a Ophtalmia de que tratamos.

Todos sabem, que a Ophtalmia consiste em huma inflammação da tunica adnata, ou conjuntiva do olho, e que esta admite varios grãos, os quaes os AA. denominaõ, e distinguem com diversos nomes. Ao primeiro, e mais leve destes grãos deraõ os Gregos o nome de *taraxis* (perturbação); e ao ultimo, e mais vehemente, o de *Chemosis*; cujos termos haõ sido adoptados por todos. Nesta segunda especie de Ophtalmia se entumece a adnata de tal forte, que excedendo a grossura de algumas linhas acima da cornea transparente vem a constituir huma especie de fossa, ou cova, em consideração da qual lhe impozeraõ os antigos aquelle nome. A inflammação não se limita á conjunctiva, ou tunica exterior do olho, porém entranha-se, e se estende ás mais interiores, de modo, que não poucas vezes produz a ruina total do globo do olho. A todos os outros grãos; que se comprehendem entre as duas mencion-

cionadas especies , compete o nome geral de *Ophtalmia* , a qual por tanto pode ser mais , ou menos grave , segundo se approximar mais ao ultimo , ou ao primeiro daquelles dous extremos.

Tem-se observado , que a *Ophtalmia venerea* , ainda que não exclua aquell'outras mais leves especies , que acabamos de referir , he á chemosis , que pertence pela maior parte. A febre , as dores fortes de cabeça , o rubor das faces , a epifora , ou continua derramação de ardentes lagrimas , que chegaõ a escoriar o rosto , a caracterisaõ ordinariamente por huma das mais violentas inflammaçoens. Nota-se de mais disso huma especie de purgação bem semelhante á da *Gonorrhea* , a qual parece confirmar a doutrina da metástase.

Já dissemos , que a causa mais ordinaria desta ophtalmia era a supressão do fluxo da gonorrhea : não negamos , que ella possa acontecer por effeito do gallico geral , independente da materia virulenta da gonorrhea , porém o nosso objecto limita-se áquella especie , que com effeito he muito mais frequente , violenta , e arriscada.

Tu-

Tudo o q̃ pode suspender intempestivamente a purgação da gonorrhœa ; o frio , as injeções adstringentes , os remedios balsamicos , e estílicos internos , o máo regimen , todo o genero de excessão , &c. dará occasião a esta cruel enfermidade. Ataca ella hum , ou ambos os olhos juntamente , e se se não soccorre com promptidão , a inflammação , e intumescencia se propaga a toda a sclerotica , e produz estafylomas , hypopios , suppurações , a opacidade da cornea , chagas , e escoriações , e finalmente huma completa cegueira. Não poucas vezes se communica a mesma intumescencia á membrana interna , ou conjunctiva das palpebras , por effeito da qual estas se revirao para o lado externo , e constituem hum perfeito *ectropio*.

São por tanto necessarios os mais promptos , e efficazes remedios , a fim de evitarmos estas funestas , e terriveis consequencias. A resolução he a terminação mais favoravel , que devemos procurar ; e por isso nos apressaremos a fazer as evacuações geraes , e particulares. São necessarias as sangrias largas , e

repetidas, que se principiem pelos pés, e passem depois aos braços. As bichas de tras das orelhas, nas fontes, ou cantos dos olhos, são recommendadas por muitos, e se applicarão no caso da molestia não ceder ás primeiras evacuações. O mesmo dizemos dos vesicatorios applicados de tras das orelhas, ou na nuca.

Sobre o uso dos mercuriaes internos, que a maior parte dos AA. aconselhaõ, deve haver grande circumspecção em quanto a inflamação for mui activa. Todas as preparações deste mineral são estimulantes, e consequentemente perigosas em casos taes. O mercurio gummoso de Plenck, porque vai unido a huma substancia adoçante, he huma das mais doces preparações, que eu conheço, e por isso em caso de necessidade me serviria eu desta formula. As formas salinas são muito mais activas, e irritantes. Não se devem poupar as bebidas adoçantes, e diluentes: os cozimentos frescos, as amendoadas, os soros de leite, &c, dados em muita quantidade, enchem esta indicação. O nitro he o unico sal,
de

de que nos serviremos, para ajuntar a qual-quer das formulas prescritas. Os purgantes, que muitos aconselhaõ, por mais brandos que se-jaõ, são para mim suspeitosos. No capitulo da Gonorrhœa já nós advertimos, que elles não obraõ sem estímulo, e este não convem. Faça-le antes uso de cristeis emollientes, e laxantes, e repitaõ-se as vezes necessarias. Os remedios topicos haõ de ser da classe dos antiflogísticos: os lavatorios de cozimen-to de flor de sabugueiro, de malvas, de Coroa de Rei; a cataplasma de maçans ca-moezas, fervidas em leite; os banhos, e la-vatorios da emulsão das quatro sementes frias, feita em agua de flor de sabugueiro, &c. são os que lembro. O opio unido a es-tes remedios locais he de grande proveito, quando as dores são muito intensas. Eu me sirvo algumas vezes por este respeito dos trociscos de Rhasis com opio, dissolvidos em sufficiente quantidade de agua.

Sobre as applicações locais de mercurio devemos ter o mesmo receio que referi-mos ácerca das internas. No estado da inflam-

mação apenas acho que poderá ter lugar o leite mercurial de Plenck.

Huma coufa, que tratao os AA. como mui effencial para a cura da Ophtalmia venerea, vem a ser a restituição do fluxo gonorrhico supprimido. Para este fim se porão em uso os feringatorios emollientes, e laxantes, as cataplasmas da mesma natureza, applicadas sobre o perinêo; semicupios d'agua morna, cristeis emollientes, &c. Se nada disto bastar recorreremos á inoculação do virus gonorrhico por meio de huma velinha, embebida do dito virus, como prescreve Lange (Differt. de Ophtalm.). Varias operaçoens cirurgicas tem sido recômendadas por diversos Auctores para a cura desta molestia. Camerario inculca huma incisão circular á roda, e junto da cornea transparente (*a*): propoem Mauchart a sua decantada *Ophthalmoxysse*,

(*a*) V. Alex. Camer. et Jul. Frider. Breyer Dissert. de Opht. Vener. et pecul. in illa operat. insert. no 1.º Tom. da Collecção de Haller. De Morbor. Disputationib. pag. mih. 283.

xyse, a qual consiste na escarificação da conjunctiva, por meio de hum pincelinho de espinhas de centeio, a que dá o nome de *Xystis* (a). Aconselhaõ muitos a total amputação da intumescencia da adnata, etc. Porém esta cirurgia sanguinaria, que teve o seu berço entre os Gregos, tem sido despresada. Apenas poderão ter lugar, no caso dos outros remedios não produzirem effeito, as leves escarificaçoens, praticadas com huma lanceta, como recommenda Plenck (De Morb. oculor.), Nisbet, e outros. A outra operação, que se não pode escusar, he a abertura dos abscessos da cornea, e sclerotica, dado o caso, que a inflammação termine por suppuração. Por meio desta evitaremos nós a cegueira total, que costuma produzir esta terminação, não sendo assim soccorrida.

Depois que a inflammação começa a ceder, e tem passado a sua maior intensidade, po-

(a) V. Dissert. Medico-Chir. de Ophthalmoxysi. no 2.^o Tom. de Haller. De Disput. Chirurg. pag. mihi. 21.

podem ter lugar as preparaçõens mercuriaes mais activas, e o mesmo sublimado corrosivo, diluido convenientemente em algum co-
zimento emolliente, agua rosada, ou outra
semelhante. Convém igualmente alguns reme-
dios adstringentes daquelles, que a pratica
tem consagrado a estas molestias, como são
todas as preparaçõens de zinco, a tutia, a
pedra divina etc., as quaes se podem unir
aos remedios acima expostos, proporcionando-
os ao estado da inflammação, e irritabilida-
de do sujeito. Igualmente terão lugar inter-
namente as preparaçõens de mercurio, hum
pouco mais fortes, e efficazes; as unturas,
etc., no caso, que se julguem necessarias.

Da Surdeza Venerea.

NÃO he da surdeza, que vem em conse-
quencia de hum vicio venereo universal, que
devemos aqui tratar, ainda que seja esta a
mais frequente. O nosso objecto limita-se
àquella, que succede por effeito da Gonor-
rhea

rhea supprimida do mesmo modo , que disse-
mos da Ophtalmia. Quando expozemos a
theoria desta ultima enfermidade , adverti-
mos a difficuldade , que havia em descobrir
a maneira porque ella procedia da referida
causa , e esta mesma obscuridade notamos na
presente , por cuja razao nos não demorare-
mos mais neste particular. A observação con-
stante de se ter visto succeder a surdeza á
suppressão de hum esquentamento , e desap-
parecer , logo que este fôra restituído , he hu-
ma prova assas decisiva da sua dependencia ,
e connexão.

Todos sabem , que a surdeza consiste na
falta , ou diminuição do sentido de ouvir , o
que não pode provir senão do desconcerto ,
ou abolição de algumas daquellas partes , que
formão este orgão , e que são em grande
numero , segundo nos ensina a Anatomia.

A dor activa , e vehemente ; o calor ,
e a febre , que acompanhaõ esta molestia ;
a prompta suppuração , que em bem pou-
cos dias se segue as mais das vezes , nos
persuadem que ella vem a ser huma das mais

vio-

violentas inflammaçoens , que atacam o ouvido.

Esta terminação não he nada favoravel ; porque já mais deixará de desarranjar , e destruir algumas daquellas partes , e deste modo produzir huma irremediavel surdeza.

Para a evitarmos pois , e procurar-mos a prompta resolução desta inflammação , não tardaremos com os mais efficazes soccorros de copiosas evacuaçoens sanguineas , geraes , e particulares ; emborçaçoens á parte de cozimentos emollientes , e antiflogísticos , cataplasmas da mesma natureza , etc.

Os anodynos , e o mesmo opio tem lugar no caso das dores serem fortes , e pertinazes. Os gargarejos ameadados dos mesmos cozimentos acima devem ser de grande proveito por causa da communicação , que sabemos existe entre as fauces , e ouvido interior.

Começaremos pela sangria do pé , e passando depois á do braço , não nos esqueceremos das bichas , lançadas proximas ás orelhas , e dos vesicatorios nas mesmas vesinhancas.

A respeito de diluentes , e refrigerantes internos , do uso do mercurio , da applicação de cistéis , e da reproducção da Gonorrhœa suppurada , deve-se pôr em pratica tudo quanto fica dito ácerca da Ophthalmia.



... of the ...
 ... of the ...
 ... of the ...
 ... of the ...



I N D I C E

D A S M A T E R I A S.

<i>Prefacção do Traductor</i>	- -	pag. v
<i>do Auêtor</i>	- - - -	xi
<i>Gonorrhœa Virulenta</i>	- - - - -	I
<i>Hernia Venerea</i>	- - - - -	61
<i>Esquentamento encabrestado</i>	- - -	71
<i>Bubaõ, ou encordio</i>	- - - - -	75
<i>Fymose, e parafymose</i>	- - - -	92
<i>Cancros Venereos</i>	- - - - -	103
<i>Obstrucçoens da urethra, vulgarmente Carnosidades</i>	- - -	120
<i>Corrimentos habituaes, que restão depois da gonorrhœa</i>	- - -	142
<i>Ophtalmia Venerea</i>	- - - - -	156
<i>Surdeza Venerea</i>	- - - - -	166

INDEX

Page

1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	...
16	...
17	...
18	...
19	...
20	...
21	...
22	...
23	...
24	...
25	...
26	...
27	...
28	...
29	...
30	...
31	...
32	...
33	...
34	...
35	...
36	...
37	...
38	...
39	...
40	...
41	...
42	...
43	...
44	...
45	...
46	...
47	...
48	...
49	...
50	...
51	...
52	...
53	...
54	...
55	...
56	...
57	...
58	...
59	...
60	...
61	...
62	...
63	...
64	...
65	...
66	...
67	...
68	...
69	...
70	...
71	...
72	...
73	...
74	...
75	...
76	...
77	...
78	...
79	...
80	...
81	...
82	...
83	...
84	...
85	...
86	...
87	...
88	...
89	...
90	...
91	...
92	...
93	...
94	...
95	...
96	...
97	...
98	...
99	...
100	...

E R R A T A S

Pag.	Linha.	Erros.	Emendas.
9	2	outtas	outras
10	6	he attrahido	saõ attrahidas
	8	produz	produzem
11	13	abforvancia	abforvencia
12	17	esbranquecido	esbranquiçado
14	15	do Cowper	de Cowper
	16	callo	collo
15	16	mais	menos
16	11	do paciente	da paciente
36	20	os reprovão	as reprovão
39	13	doeute	doente
41	9	fna	sua
42	4	d'onrina	d'ourina
43	24	em attenção	fem attenção
63	15	conhecimentos	conhecimentos
90	16	alais	aliás
109	8	desde	e desde
130	18	Gaulard	Goulard
132	16	qassagem	passagem
136	7	pôs	pés
140	20	iet	fer
150	9	perada	parada

